

## Флебавен



### Код АТХ:

- [C05CA53](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Очищенная микронизированная флавоноидная фракция \(диосмин\)](#)
- [гесперидин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг. По 16 табл. в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой. 2, 4 или 6 контурных ячейковых упаковок помещают в пачку из картона.

### Состав:

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	1 табл.
<i>ядро</i>	
<i>активное вещество:</i>	
очищенная микронизированная флавоноидная фракция, субстанция-гранулы	613 мг
<i>активное вещество субстанции-гранул (500 мг):</i> диосмин — 450 мг (90%); другие флавоноиды в пересчете на гесперидин — 50 мг (10%)	

## Флебавен

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

<i>вспомогательные вещества субстанции-гранул:</i> МКЦ — 82 мг; повидон К30 — 31 мг	
<i>вспомогательные вещества:</i> карбоксиметилкрахмал натрия — 27 мг; тальк — 6 мг; магния стеарат — 4 мг	
<i>оболочка пленочная:</i> <i>Opadry</i> оранжевый 03Н32599 (гипромеллоза — 71,714%, титана диоксид (E171) — 15,936%, тальк — 6,972%, пропиленгликоль — 4,98%, краситель железа оксид желтый (E172) — 0,332%, краситель железа оксид красный (E172) — 0,066%) — 18 мг	

## Описание:

Капсуловидные, двояковыпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой светлого оранжево-розового цвета.

*Вид таблеток на изломе:* шероховатая масса от желтого до коричнево-желтого цвета с пленочной оболочкой светлого оранжево-розового цвета.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

## Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — ангиопротективное, вентонизирующее.

### Фармакодинамика

Комбинация гесперидин + диосмин обладает вентонизирующим и ангиопротективным свойствами.

Уменьшает растяжимость вен и венозный застой, в микроциркуляции снижает проницаемость капилляров и повышает их резистентность, улучшает показатели венозной гемодинамики. Оказывает влияние на следующие венозные плетизмографические параметры: венозная емкость, венозная растяжимость, время венозного опорожнения.

Оптимальный эффект достигается при приеме 2 табл.

Комбинация гесперидин + диосмин повышает венозный тонус за счет уменьшения времени венозного опорожнения. У пациентов с признаками выраженного нарушения микроциркуляции отмечается повышение капиллярной резистентности.

Комбинация гесперидин + диосмин эффективна при лечении хронических заболеваний вен нижних конечностей, а также при лечении геморроя.

## Показания к применению:

Симптоматическая терапия венозной недостаточности нижних конечностей: ощущение тяжести и боль в ногах.

Симптоматическая терапия острого геморроя.

## Относится к болезням:

- [Венозная недостаточность](#)
- [Геморрой](#)

## Противопоказания:

Период лактации (грудного вскармливания), повышенная чувствительность к диосмину и гесперидину.

## Способ применения и дозы:

Принимают внутрь.

При венозно-лимфатической недостаточности суточная доза составляет 900 мг диосмина + 100 мг гесперидина. Кратность приема – 2 раза/сут (в середине дня и вечером во время приема пищи).

При остром геморрое в течение первых 4 дней суточная доза составляет – 2.7 г диосмина + 300 мг гесперидина (в 2 приема утром и вечером), в течение последующих 3 дней суточная доза составляет 1.8 г диосмина + 200 мг гесперидина (в 2 приема утром и вечером).

## Побочное действие:

Диагнозы

- Тромбоз глубоких вен
- Тромбофлебит
- Трофическая язва голени, стопы

## Передозировка:

Случаев передозировки не описано.

При передозировке препарата Флебавен® следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

До настоящего времени не было сообщений о каких-либо побочных эффектах при применении данной комбинации у беременных женщин. В экспериментальных исследованиях не наблюдалось тератогенных эффектов комбинации диосмин+гесперидин.

Противопоказано применение в период лактации (грудного вскармливания), т.к. неизвестно, выделяются ли диосмин и гесперидин с грудным молоком.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не отмечалось.

Следует информировать лечащего врача обо всех применяемых пациентом препаратах.

## Особые указания и меры предосторожности:

При обострении геморроя применение данной комбинации не заменяет специфического лечения других анальных нарушений. Продолжительность лечения не должна превышать рекомендуемые сроки. В том случае, если симптомы не исчезают после короткой терапии, следует провести проктологическое обследование и пересмотреть проводимую терапию.

При наличии нарушений венозного кровообращения максимальный эффект лечения обеспечивается сочетанием со здоровым, хорошо сбалансированным стилем жизни, при котором желательно избегать долгого пребывания на солнце, длительного пребывания на ногах, а также снизить избыточную массу тела, совершать пешие прогулки и в некоторых случаях - носить специальные чулки, улучшающие циркуляцию крови.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Flebaven>