Флебопресс



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Капсулы*** твердые желатиновые №0 с корпусом светло-желтого цвета с коричневатым оттенком и крышечкой светло-фиолетового цвета, непрозрачные; содержимое капсул - гранулированный порошок или смесь порошка и гранул от желтого до зеленовато-желтого цвета, допускается уплотнение содержимого капсулы в комки.

	1 капс.
троксерутин	300 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 39.5 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 7 мг, магния стеарат - 3.5 мг.

Состав корпуса капсулы: краситель железа оксид красный - 0.0071%, краситель железа оксид желтый - 0.1227%, титана диоксид - 2%, желатин - до 100%.
Состав крышечки капсулы: краситель бриллиантовый голубой - 0.019%, краситель красный очаровательный - 0.045%, титана диоксид - 3%, желатин - до 100%.

10 шт. - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (5) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (6) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки контурные ячейковые (10) - пачки картонные.
30 шт. - упаковки контурные ячейковые (1) - пачки картонные.
30 шт. - упаковки контурные ячейковые (2) - пачки картонные.
30 шт. - упаковки контурные ячейковые (3) - пачки картонные.
30 шт. - упаковки контурные ячейковые (5) - пачки картонные.
30 шт. - упаковки контурные ячейковые (6) - пачки картонные.
30 шт. - упаковки контурные ячейковые (10) - пачки картонные.
10 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.
20 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.
30 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.
50 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.
60 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.
100 шт. - банки из полиэтилентерефталата (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство для лечения хронической венозной недостаточности. Является производным рутина, обладает Р-

витаминной активностью. Уменьшает проницаемость и ломкость капилляров, оказывает противоотечное действие.

Показания к применению:

Варикозное расширение вен, поверхностный тромбофлебит, трофические нарушения при хронической венозной недостаточности (дерматиты, трофические язвы), геморроидальные узлы.

Относится к болезням:

- Венозная недостаточность
- Геморрой
- Дерматит
- Тромбоз
- Тромбофлебит
- Трофические язвы

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к троксерутину.

Способ применения и дозы:

Для приема внутрь суточная доза - 60-90 мг в течение 2-4 недель. Для в/м или в/в введения доза составляет 500 мг через день.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Особые указания и меры предосторожности:

Троксерутин можно применять в качестве одного из компонентов комплексного лечения.

Источник: http://drugs.thead.ru/Flebopress