Флогэнзим



Код АТХ:

- L03AX

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой*** зеленовато-желтого цвета, круглые, двояковыпуклые, с гладкой поверхностью, с характерным запахом; допускаются незначительные отклонения от однородности окраски оболочки (мраморность рисунка, точечные вкрапления).

	1 таб.
бромелаин	450 ЕД. FIP
трипсин	1440 ЕД. FIP
рутозид (рутин)	100 мг

Вспомогательные вещества: лактозы гидрат, крахмал кукурузный, магния стеарат, стеариновая кислота, вода очищенная, кремния диоксид коллоидный безводный, тальк.

Состав оболочки таблеток: макрогол 6000, метакриловая кислота - метил-метакрилат сополимер (1:1), тальк, триэтилцитрат, ванилин.

20 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
20 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.
20 шт. - блистеры (10) - пачки картонные.
800 шт. - флаконы из полиэтилена высокой плотности.

Фармакотерапевтическая группа:

- Иммунотропные средства
- Метаболики
- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Флогэнзим представляет собой комбинацию ферментов (бромелаин и трипсин) и рутина. Бромелаин и трипсин способствуют быстрому расщеплению клеточных фрагментов и метаболических продуктов воспалительного процесса, рутин восстанавливает проницаемость стенок сосудов, что приводит к уменьшению отеков и гематом.

Флогэнзим оказывает противовоспалительное, фибринолитическое, антиагрегантное, иммуномодулирующее и противоотечное действие, комплексно воздействуя на физиологические и патофизиологические процессы.

Улучшает функциональное состояние клеток крови и сосудистой стенки; снижает вязкость крови и риск образования тромбов в сосудах, способствует лизису уже образовавшихся тромбов. Улучшает микроциркуляцию в очагах хронического воспаления, повышает доставку кислорода и питательных веществ, стимулируя тем самым репаративные процессы при хронических заболеваниях и в послеоперационном периоде. В результате этого уменьшается отек, быстрее рассасываются гематомы и уменьшается болевой синдром.

Флогэнзим улучшает кровоснабжение бронхов и легких при хронических заболеваниях верхних дыхательных путей, в т.ч. обусловленных курением; разжижает мокроту, улучшает функцию мерцательного эпителия и восстанавливает дренажную функцию бронхов.

Препарат повышает эффективность антибиотикотерапии.

Фармакокинетика

После приема Флогэнзима внутрь входящие в состав препарата ферменты всасываются из тонкой кишки путем резорбции интактных молекул и, связываясь с транспортными белками крови, попадают в кровоток. Затем ферменты, мигрируя по сосудистому руслу, накапливаются в зоне патологического процесса, независимо от места локализации в организме.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии:

— лечение послеоперационных осложнений в хирургии, стоматологии и при пластических операциях (нагноение, тромбозы, спайки); с целью профилактики спаечной болезни, лимфатических отеков, микроциркуляторных расстройств; при ожогах;

— повреждения сухожилий, связок, спортивные травмы;

— лечение острого тромбоза глубоких вен, тромбофлебитов поверхностных вен, постфлебитического синдрома, хронических артериопатий (в т.ч. облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей);

— лечение острых и хронических воспалений мочеполового тракта (уретрит, цистит, цистопиелит, простатит);

— лечение острых и хронических воспалительных заболеваний органов малого таза (аднексит, сальпингоофорит), сосудистых осложнений климактерического периода, для снижения частоты и выраженности побочных эффектов заместительной гормональной терапии в гинекологии;

— ИБС, профилактика приступов стенокардии;

— хронический гепатит;

— ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилоартрит, реактивный артрит, ревматическое поражение мягких тканей.

Относится к болезням:

- Аднексит
- Анкилозирующий спондилоартрит
- Артрит
- Артроз
- Атеросклероз
- Воспаление
- Гепатит
- Гепатоз
- Простатит
- Реактивный артрит
- Ревматизм

- Сальпингит
- Сальпингоофорит
- Спондилоартрит
- Стенокардия
- Стоматит
- Травмы
- Тромбоз
- Тромбофлебит
- Уретрит
- Цистит

Противопоказания:

— врожденные или приобретенные нарушения свертывания крови (в т.ч. гемофилия);

— детский возраст (опыт применения отсутствует);

— индивидуальная непереносимость препарата.

С *осторожностью* применять при проведении гемодиализа.

Способ применения и дозы:

Взрослым *с целью лечения* препарат назначают по 3 таб. 3 раза/сут в течение 2 недель.

С целью профилактики рекомендуется применять по 2 таб. 3 раза/сут в течение 2 недель.

Изменение дозы препарата или курса лечения врач определяет индивидуально.

Таблетки следует принимать не менее чем за 30 мин до еды, не разжевывая, запивая водой (200 мл).

Побочное действие:

Флогэнзим хорошо переносится пациентами. *В отдельных случаях* наблюдаются учащение стула, изменения консистенции и запаха кала, которые быстро купируются при временном снижении дозы препарата. *Редко* возникают аллергические реакции (кожная сыпь, зуд), которые исчезают после прекращения лечения препаратом. При применении препарата отмечались тошнота, метеоризм, боли в животе, головная боль, головокружение, экзантема, общая слабость. Возможно появление временного ощущения переполнения кишечника. Это можно предотвратить, разделив суточную дозу на большее количество разовых доз.

Передозировка:

О случаях передозировки препарата Флогэнзим не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

С осторожностью следует назначать Флогэнзим при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном приеме с антибиотиками Флогэнзим повышает эффективность антибиотикотерапии.

Случаев несовместимости Флогэнзима с другими лекарственными средствами не отмечалось.

Особые указания и меры предосторожности:

При инфекционно-воспалительных заболеваниях Флогэнзим не заменяет лечения антибиотиками.

При обострении симптомов заболевания на фоне приема Флогэнзима рекомендуется временное уменьшение дозы. В таких случаях пациент должен обратиться к врачу.

Препарат не является допингом.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не оказывает негативного влияния на способность к вождению автомобиля и выполнению работ, требующих высокой скорости психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

С осторожностью применять при проведении гемодиализа.

Применение в детском возрасте

Препарат противопоказан к применению у детей (опыт применения отсутствует).

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Flogenzim