

## Флонивин БС



### Код АТХ:

- [A07FA](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Капсулы** твердые желатиновые, размер №2, матовые, молочно-белого цвета; содержимое капсул - аморфный порошок бело-серого или бледно-желтого цвета, со специфическим запахом.

	<b>1 капс.</b>
лиофильно высушенные споры <i>Bacillus cereus</i> IP 5832	35 мг

*Вспомогательные вещества:* кальция карбонат - 35 мг, каолин - 100 мг.

*Состав оболочки капсулы:* желатин - 61.74 мг, титана диоксид (C177891) - 1.26 мг.

8 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)
- [Органотропные средства](#)

### Фармакологические свойства:

#### **Фармакодинамика**

Бактерии *Bacillus cereus* IP 5832 выделяют антибактериальные вещества широкого спектра действия, подавляющие развитие патогенных и условно патогенных бактерий, оказывающие противомикробное, противодиарейное действие, восстанавливает кишечную микрофлору. Споры бактерий, содержащиеся в препарате, устойчивы к действию желудочного сока. Их прорастание в вегетативные формы бактерий происходит в кишечнике.

### Показания к применению:

- лечение острой и хронической диареи различного генеза;
- лечение колитов, энтероколитов;
- профилактика и лечение дисбактериозов кишечника (в т.ч. развившихся в результате антибиотико- или химио-

или радиотерапии);

— нарушения ферментации (метеоризм).

## Относится к болезням:

- [Дисбактериоз](#)
- [Колит](#)
- [Энтерит](#)

## Противопоказания:

— первичные иммунодефициты;

— повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.

## Способ применения и дозы:

Внутрь.

Флонивин БС назначают **детям старше 7 лет и взрослым:**

— **детям старше 7 лет** - по 1-2 капсулы 2-3 раза/сут в течение 7-10 сут;

— **взрослым** - по 2 капсулы 2-4 раза/сут в течение 7-10 сут.

Принимать Флонивин БС следует за 1 ч до еды.

Нельзя запивать Флонивин БС горячей жидкостью или принимать его с алкогольными напитками.

## Побочное действие:

При применении препарата по показаниям в рекомендованных дозах побочное действие не выявлено.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Препарат устойчив к действию различных антибиотиков и сульфаниламидных лекарственных средств, поэтому может быть назначен совместно с последними. Необходимо сообщать лечащему врачу об одновременно принимаемых лекарственных препаратах.

## Особые указания и меры предосторожности:

Препарат применяется по назначению врача, не следует принимать препарат бесконтрольно или по совету третьих лиц.

Если при лечении улучшение не наступает в течение 3-х дней, препарат следует отменить.

### **Применение в детском возрасте**

Флонивин БС назначают **детям старше 7 лет** - по 1-2 капсулы 2-3 раза/сут в течение 7-10 сут.

## Условия хранения:

Хранить препарат в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Флонивин БС**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

**Срок годности:**

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Flonivin\\_BS](http://drugs.thead.ru/Flonivin_BS)