Флорин форте



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бифидобактерии бифидум
- Лактобактерии плантарум

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru

Форма выпуска:

◊ ***Порошок для приема внутрь*** от светло-серого до темно-серого цвета с черными вкраплениями, со слабым кисломолочным запахом.

	1 пак.
Bifidobacterium bifidum (сорбированные на активированном угле)	не менее 50 млн. КОЕ
Lactobacillus plantarum 8P-A3	не менее 50 млн. КОЕ

Вспомогательные вещества: лактоза.

Пакеты из многослойного металлополимерного материала (10) - пачки картонные.
Пакеты из многослойного металлополимерного материала (20) - пачки картонные.
Пакеты из многослойного металлополимерного материала (30) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат биологического происхождения, регулирующий равновесие кишечной микрофлоры, пробиотик. Содержит два основных компонента нормофлоры кишечника.

Бифидобактерии и лактобактерии, входящие в состав препарата, обладают высокой антагонистической активностью в отношении патогенных и условнопатогенных микроорганизмов, угнетают их жизнедеятельность, препятствуют их адгезии к слизистой оболочке кишечника, создают благоприятные условия для развития полезной микрофлоры кишечника, поддерживают и регулируют физиологическое равновесие кишечной микрофлоры, обеспечивают ее физиологические функции, способствуют нормализации микробиоценоза ЖКТ и повышению неспецифической резистентности организма, обладают иммуномодулирующим действием.

Сорбированные в виде микроколоний бифидобактерии имеют преимущества для размножения на слизистой кишечника. Лактобактерии совместно с бифидобактериями оказывают усиленное подавляющее действие на ротавирусы и гемолитическую кишечную палочку. Бактерии нормальной микрофлоры, входящие в состав препарата, активизируют пристеночное пищеварение, участвуют в ферментативном расщеплении белков, жиров, углеводов, в процессах метаболизма желчных кислот и холестерина, что обеспечивает гипохолестеринемическое действие, способствуют всасыванию железа, кальция, витамина D, синтезируют аминокислоты, витамины (особенно группы B).

Лактоза обладает пребиотическими свойствами, способствует росту бактерий нормальной микрофлоры кишечника.

Показания к применению:

— заболевания, сопровождающиеся нарушением нормальной микрофлоры кишечника с дефицитом бифидобактерий, лактобактерий или нормальных кишечных палочек;

— острые кишечные инфекции, обусловленные ротавирусами, условно-патогенной микрофлорой, и в период реконвалесценции для полного восстановления нормофлоры кишечника;

— острые кишечные инфекции неустановленной этиологии;

— хронические заболевания ЖКТ, в т.ч. с выявленными гемолитическими кишечными палочками и ассоциациями условно-патогенных микроорганизмов в высоких титрах.

Относится к болезням:

- Инфекции
- Реконвалесценция

Противопоказания:

— индивидуальная непереносимость препарата.

Способ применения и дозы:

Флорин форте принимают внутрь во время приема пищи, при необходимости независимо от приема пищи.

Препарат перед употреблением смешивают с жидкой пищей, желательно кисломолочным продуктом, для новорожденных и грудных детей - с материнским молоком или смесью для искусственного вскармливания.

Можно смешать препарат с 30-50 мл кипяченой воды комнатной температуры, при этом образуется мутная взвесь с частичками сорбента черного цвета. Полученную водную взвесь следует выпить, не добиваясь полного растворения.

Взрослым назначают по 2 пакетика 3 раза/сут; **детям в возрасте 3 лет и старше** - по 1 пакетику 3-4 раза/сут, **в возрасте от 6 месяцев до 3 лет** - по 1 пакетику 3 раза/сут, **в возрасте до 6 месяцев** - по 1 пакетику 2 раза/сут.

Курс лечения *при острых кишечных инфекциях* составляет 5-7 дней, *при дисбактериозе кишечника* - 10-15 дней.

Побочное действие:

При применении по показаниям в рекомендуемых дозах побочное действие препарата не установлено.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат разрешен для применения при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном приеме с витаминами (особенно группы В) действие препарата усиливается.

При приеме с антибиотиками возможно снижение терапевтической эффективности препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует применять препарат при лактазной недостаточности.

Применение в детском возрасте

Препарат применяют у детей по показаниям и в рекомендуемых дозах.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 10°C. Срок годности - 1 год. Транспортирование осуществляется при температуре не выше 10°C; допускается транспортирование при температуре до 20°C не более 10 сут. Нижняя граница температуры не лимитируется.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Florin_forte