Флорин форте (капсулы)



Код АТХ:

- A07FA

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Бифидобактерии бифидум
- Лактобактерии плантарум

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru

Форма выпуска:

Порошок для приема внутрь. В пакете из многослойного металлополимерного материала. 10, 20 или 30 пак. в пачке из картона.

Состав:

Порошок для приема внутрь	1 пак.
активные вещества:	
бифидобактерии, сорбированные на активированном угле	не менее 50 млн (5×10^7) КОЕ
лактобактерии	не менее 50 млн (5×10^7) КОЕ
вспомогательное вещество: лактозы моногидрат — до 0,85 г	

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — иммуномодулирующее, улучшающее пищеварение, нормализующее микрофлору кишечника, антидиарейное.

Способ применения и дозы:

Внутрь, во время приема пищи, при необходимости независимо от приема пищи.

Препарат перед употреблением смешивают с жидкой пищей, желательно кисломолочным продуктом, новорожденным и детям грудного возраста — с материнским молоком или смесью для искусственного вскармливания. Можно смешать препарат с 30–50 мл кипяченой воды комнатной температуры, при этом образуется мутная взвесь с частичками сорбента черного цвета. Полученную водную взвесь следует выпить, не добиваясь полного растворения.

Дети до 6 мес — по 1 пак. 2 раза в день; с 6 мес до 3 лет — по 1 пак. 3 раза в день; с 3 лет и старше — по 1 пак. 3–4 раза в день; взрослые — по 2 пак. 3 раза в день.

Курс лечения при острых кишечных инфекциях — 5–7 дней, ОРЗ — 5–10 дней, дисбактериозах, заболеваниях, сопровождающихся нарушением нормальной микрофлоры кишечника, хронических заболеваниях ЖКТ и в период реконвалесценции после перенесенных заболеваний — 10–15 дней.

Источник: http://drugs.thead.ru/Florin_forte_kapsuly