

## [Флуоресцеин Новартис](#)



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Флуоресцеин натрия](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)  
[Госреестр МНН](#) [Википедия МНН](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru Drugs.com](#)англ

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Средство для флюоресцентной ангиографии и ангиоскопии в офтальмологии. Желто-зеленая флюоресценция активного вещества позволяет отграничить область васкуляризации от окружающих тканей для улучшения визуализации.

### **Показания к применению:**

Диагностическая ангиография или ангиоскопия в офтальмологии.

### **Относится к болезням:**

- [Ангина](#)

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к флуоресцеину.

### **Способ применения и дозы:**

Вводят в/в по специальной методике. Визуализацию сосудов сетчатки и хориоидальных сосудов можно проводить через 9 и 14 мин после введения.

### **Побочное действие:**

Тошнота, головная боль, желудочно-кишечные нарушения, синкопе, рвота, крапивница, артериальная гипотензия,

остановка сердца, бронхоспазм, ишемия базилярной артерии, шок, судороги, тромбофлебит в месте инъекции, в отдельных случаях - летальный исход.

При экстравазации возникает сильная боль в месте инъекции и возможна тупая боль в соответствующей конечности.

## **Применение при беременности и кормлении грудью:**

Необходимо избегать проведения ангиографии при беременности, особенно в I триместре. Безопасность применения флуоресцеина при беременности не изучена. Флуоресцеин выделяется с грудным молоком. С осторожностью применять в период лактации.

## **Особые указания и меры предосторожности:**

Предназначен только для в/в введения и диагностических процедур в офтальмологии.

С осторожностью применять у пациентов с указаниями в анамнезе на аллергические реакции, бронхоспазм.

Следует избегать экстравазации при проведении инъекции. Вследствие экстравазации возможны некрозы кожи, поверхностный флебит, подкожная гранулема, токсический неврит в области инъекции. При значительной экстравазации инъекцию следует прекратить.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Fluorescein\\_Novartis](http://drugs.thead.ru/Fluorescein_Novartis)