Формидрон



Код АТХ:

- D08AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Формальдегид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для наружного применения спиртовой***	**100 мл**
раствора формальдегида спиротвого 36.5-37.5% формальдегид	10 г,
соответствует формальдегида	3.7 г

50 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает антисептическое и дезодорирующее действие.

Показания к применению:

— повышенное потоотделение.

Противопоказания:

— воспалительные заболевания кожи;

— детский возраст до 16 лет.

Способ применения и дозы:

Наружно, рекомендуется протирать межпальцевые складки ног небольшим количеством жидкости 1 раз в день. На участки кожи с повышенной потливостью (подошвы, ладони, межпальцевые складки) после гигиенического душа и высушивания препарат наносят на 30-40 мин. Затем препарат смывают теплой водой. На нежную чувствительную кожу (подмышечные впадины и ладони у женщин) препарат нужно наносить на срок не более 20 мин. После этого кожу следует тщательно вымыть теплой водой без моющих средств и припудрить тальком или детской присыпкой. После бритья подмышечных впадин Формидрон можно наносить не ранее, чем через сутки. Одной процедуры достаточно, чтобы снизить потливость кожи на 7-12 дней. При резко выраженной потливости процедуру проводят 2-3 дня подряд.

Побочное действие:

Аллергические реакции, местные реакции. При длительном использовании - сухость кожи. В этом случае применение препарата прекращают.

Передозировка:

Нет данных.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Нет данных.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нет данных.

Особые указания и меры предосторожности:

Раствор не следует наносить на лицо и слизистые оболочки.

Условия хранения:

При температуре от -20°С до +25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Formidron