

[Формидрон](#)



Код АТХ:

- [D08AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Формальдегид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Раствор для наружного применения спиртовой	100 мл
раствора формальдегида спиртового 36.5-37.5% формальдегид	10 г,
соответствует формальдегида	3.7 г

50 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат, оказывает антисептическое и дезодорирующее действие.

Показания к применению:

— повышенное потоотделение.

Противопоказания:

— воспалительные заболевания кожи;

— детский возраст до 16 лет.

Способ применения и дозы:

Наружно, рекомендуется протирать межпальцевые складки ног небольшим количеством жидкости 1 раз в день. На участки кожи с повышенной потливостью (подошвы, ладони, межпальцевые складки) после гигиенического душа и высушивания препарат наносят на 30-40 мин. Затем препарат смывают теплой водой. На нежную чувствительную кожу (подмышечные впадины и ладони у женщин) препарат нужно наносить на срок не более 20 мин. После этого кожу следует тщательно вымыть теплой водой без моющих средств и припудрить тальком или детской присыпкой. После бритья подмышечных впадин Формидрон можно наносить не ранее, чем через сутки. Одной процедуры достаточно, чтобы снизить потливость кожи на 7-12 дней. При резко выраженной потливости процедуру проводят 2-3 дня подряд.

Побочное действие:

Аллергические реакции, местные реакции. При длительном использовании - сухость кожи. В этом случае применение препарата прекращают.

Передозировка:

Нет данных.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Нет данных.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нет данных.

Особые указания и меры предосторожности:

Раствор не следует наносить на лицо и слизистые оболочки.

Условия хранения:

При температуре от -20°C до +25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Formidron>