

Фосфалюгель



Код АТХ:

- [A02AB03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Алюминия фосфат](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр^{МНН}](#) [Википедия^{МНН}](#)

[PLS VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com^{англ}](#)

Форма выпуска:

◇ **Гель для приема внутрь** белого или почти белого цвета, гомогенный после перемешивания, с запахом апельсина.

	1 пак.
алюминия фосфата гель 20%	10.4 г,
что соответствует содержанию алюминия фосфата	2.08 г

Вспомогательные вещества: сорбитол 70% - 4.48 г, агар-агар 800 - 45 мг, пектин - 87 мг, кальция сульфата дигидрат - 12 мг, калия сорбат - 40 мг, ароматизатор апельсиновый - 80 мг, вода очищенная - до 16 г.

16 г - пакетики многослойные термосвариваемые (20) - пачки картонные.

◇ **Гель для приема внутрь** белого или почти белого цвета, гомогенный после перемешивания, с запахом апельсина.

	1 пак.
алюминия фосфата гель 20%	12.38 г,
что соответствует содержанию алюминия фосфата	2.48 г

Вспомогательные вещества: сорбитол 70% - 4.286 г, агар-агар 800 - 80 мг, пектин - 100 мг, кальция сульфата дигидрат - 10 мг, калия сорбат - 53 мг, ароматизатор апельсиновый - 32 мг, вода очищенная - до 20 г.

20 г - пакетики многослойные термосвариваемые (20) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антацидный препарат. Оказывает кислотонейтрализующее, обволакивающее, адсорбирующее действие. Снижает протеолитическую активность пепсина. Не вызывает ощелачивание желудочного сока, сохраняя кислотность желудочного содержимого на физиологическом уровне. Не приводит к вторичной гиперсекреции соляной кислоты. Образует защитный слой на слизистой оболочке ЖКТ. Способствует удалению токсинов, газов и микроорганизмов на всем протяжении пищеварительного тракта, нормализует пассаж содержимого по кишечнику.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Фосфалюгель не предоставлены.

Показания к применению:

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- гастрит с нормальной или повышенной секреторной функцией;
- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы;
- гастроэзофагеальный рефлюкс, рефлюкс-эзофагит, в т.ч. сопровождающийся изжогой, кислой отрыжкой;
- синдром неязвенной диспепсии;
- функциональная диарея;
- функциональные заболевания толстой кишки;
- желудочные и кишечные расстройства, вызванные интоксикацией, приемом лекарственных препаратов, раздражающих веществ (кислоты, щелочи), алкоголя.

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Грыжа](#)
- [Диарея](#)
- [Диспепсия](#)
- [Изжога](#)
- [Интоксикация](#)
- [Отрыжка](#)
- [Рефлюкс-эзофагит](#)
- [Эзофагит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

- выраженные нарушения функции почек;
- повышенная чувствительность к препарату.

Способ применения и дозы:

Взрослым и детям старше 6 лет назначают внутрь по 1-2 пакетика 2-3 раза/сут.

При *гастроэзофагеальном рефлюксе, диафрагмальной грыже* прием препарата осуществляют сразу после еды и на ночь; при *язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки* - через 1-2 ч после еды и немедленно при возникновении болей; при *гастрите, диспепсии* - до еды; при *функциональных заболеваниях толстой кишки* - утром натощак и на ночь.

Если в промежутке между приемами Фосфалюгеля боли возобновляются прием препарата можно повторить.

Фосфалюгель

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Детям в возрасте до 6 мес препарат назначают по 1/4 пакетика или 1 чайной ложке (4 г) после каждого из 6 кормлений; **детям в возрасте старше 6 мес** – по 1/2 пакетика или 2 чайные ложки после каждого из 4 кормлений.

Препарат можно принимать в чистом виде или перед приемом развести в половине стакана воды.

Правила применения препарата

Необходимо тщательно размять содержимое пакетика между пальцами для получения однородного геля.

Держа пакетик вертикально, нужно отрезать или оторвать уголок в обозначенном пунктирной линией месте.

Выдавить гель через отверстие в пакетике.

Гель можно принимать в чистом виде или развести перед приемом в половине стакана воды.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: редко - запоры (в основном у пациентов пожилого возраста и лежачих больных).

Передозировка:

Симптомы: запор, т.к. большие количества ионов алюминия подавляют перистальтику кишечника.

Лечение: применение слабительных препаратов.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата при беременности и в период лактации по показаниям в терапевтических дозах.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Фосфалюгель может снижать эффективность некоторых одновременно применяемых препаратов.

Особые указания и меры предосторожности:

Не следует длительно принимать препарат без назначения врача.

С осторожностью следует применять препарат при заболеваниях почек, циррозе печени, выраженной сердечной недостаточности.

У пациентов с нарушением функции почек и больных пожилого возраста при применении Фосфалюгеля в рекомендованных дозах возможно увеличение концентрации алюминия в сыворотке крови.

Антибиотики тетрациклиновой группы, препараты железа, сердечные гликозиды следует принимать не ранее чем через 2 ч после приема Фосфалюгеля.

При возникновении запоров на фоне приема Фосфалюгеля рекомендуется увеличивать количество ежедневно употребляемой воды.

Препарат можно применять профилактически для уменьшения абсорбции радиоактивных элементов.

Препарат не содержит сахара, поэтому может быть использован у больных с сахарным диабетом.

Применение Фосфалюгеля не отражается на результатах рентгенологического исследования.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

При нарушениях функции почек

Фосфалюгель

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

С осторожностью следует применять препарат при заболеваниях почек. Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек.

У пациентов с нарушением функции почек при применении Фосфалюгеля в рекомендованных дозах возможно увеличение концентрации алюминия в сыворотке крови.

При нарушениях функции печени

С осторожностью следует применять препарат при циррозе печени.

Применение в пожилом возрасте

У больных пожилого возраста при применении Фосфалюгеля в рекомендованных дозах возможно увеличение концентрации алюминия в сыворотке крови.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Fosfalyugel>