

Фосфоглив



Код АТХ:

- [A05BA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Глицирризиновая кислота](#)
- [Фосфолипиды](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Капсулы твердые желатиновые, №0, с оранжевым корпусом и черной крышечкой; содержимое капсул - гранулированный порошок от белого со слегка желтоватым оттенком до светло-желтого цвета, со слабым специфическим запахом.

	1 капс.
фосфолипиды (липоид С80, основной компонент - фосфатидилхолин 73-79%)	65 мг
натрия глицирризинат (тринатриевая соль глицирризиновой кислоты)	35 мг

Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кальция карбонат, кальция стеарат, тальк, кремния диоксид коллоидный (аэросил).

Состав корпуса капсулы: титана диоксид (E171), железа оксид красный (E172), метилпарагидроксибензоат (метилгидроксибензоат), пропилпарагидроксибензоат (пропилгидроксибензоат), кислота уксусная, желатин; или титана диоксид (E171), железа оксид красный (E172), желатин.

Состав крышечки капсулы: титана диоксид (E171), железа оксид черный (E172), метилпарагидроксибензоат (метилгидроксибензоат), пропилпарагидроксибензоат (пропилгидроксибензоат), кислота уксусная, желатин; или титана диоксид (E171), железа оксид черный (E172), желатин.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фосфоглив

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (5) - пачки картонные.
30 шт. - контейнеры пластиковые (1) - пачки картонные.
50 шт. - контейнеры пластиковые (1) - пачки картонные.
100 шт. - контейнеры пластиковые (1) - пачки картонные.
200 шт. - контейнеры пластиковые (1) - пачки картонные.
300 шт. - контейнеры пластиковые (1) - пачки картонные.

Лиофилизат для приготовления раствора для в/в введения в виде массы от белого до светло-желтого цвета.

	1 фл.
фосфолипиды	500 мг
Натрия глицирризинат	200 мг

Вспомогательные вещества: мальтоза.

2.5 г - флаконы (5) - пачки картонные.
2.5 г - флаконы (10) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Оказывает мембраностабилизирующее, гепатопротекторное и противовирусное действие.

Фосфатидилхолин (действующее вещество фосфолипидов) является основным структурным элементом клеточных и внутриклеточных мембран, способен восстанавливать их структуру и функции при повреждении, оказывая цитопротекторное действие. Нормализует белковый и липидный обмены, предотвращает потерю гепатоцитами ферментов и других активных веществ, восстанавливает детоксицирующую функцию печени, ингибирует формирование соединительной ткани, снижая риск возникновения фиброза и цирроза печени.

Глицират (глицирризиновая кислота и соли) обладает противовоспалительным действием, подавляет репродукцию вирусов в печени и других органах за счет стимуляции продукции интерферонов, повышения фагоцитоза, увеличения активности естественных клеток-киллеров (Natural killers). Оказывает гепатопротекторное действие благодаря антиоксидантной и мембраностабилизирующей активности. Потенцирует действие эндогенных глюкокортикостероидов, оказывая противовоспалительное и противоаллергическое действие при неинфекционных поражениях печени.

При поражениях кожи за счет мембраностабилизирующего и противовоспалительного действия компонентов ограничивает распространение процесса и способствует регрессу заболевания.

Фармакокинетика

Всасывание

После приема внутрь компоненты препарата хорошо всасываются из ЖКТ как в виде целой молекулы, так и в виде биоактивных продуктов гидролиза (ненасыщенные жирные кислоты, холин, глицерретовая кислота).

Распределение

Биоактивные продукты гидролиза хорошо распределяются в организме, проникают в печень, легкие, кожу и другие органы.

Показания к применению:

- вирусный гепатит (острый и хронический);
- жировая дегенерация печени (гепатоз);
- другие поражения печени (лекарственные, алкогольные, токсические);
- цирроз печени;
- интоксикации;
- псориаз;

- нейродермит;
- экзема.

Относится к болезням:

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Жировая дегенерация печени](#)
- [Интоксикация](#)
- [Нейродермит](#)
- [Псориаз](#)
- [Цирроз печени](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

- беременность;
 - период лактации (грудного вскармливания);
 - повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- С *осторожностью* следует назначать пациентам с портальной гипертензией.

Способ применения и дозы:

Внутрь назначают **взрослым и детям старше 12 лет** по 1-2 капсулы 3-4 раза/сут. Капсулы принимают во время еды, запивая небольшим количеством жидкости.

В/в медленно препарат вводят по 10 мл 2 раз/сут утром и вечером в течение 10 дней. Предварительно следует растворить содержимое 1 флакона в 10 мл воды для инъекций с последующим переходом на пероральный прием препарата в виде капсул.

Побочное действие:

Дерматологические реакции: при повышенной индивидуальной чувствительности возможно появление кожной сыпи, которая исчезает после отмены препарата.

Передозировка:

В настоящее время случаев передозировки препарата Фосфоглив не наблюдалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Фосфоглив не описано.

Особые указания и меры предосторожности:

Раствор для инъекций нельзя смешивать с другими растворами.

Запрещается использовать для разведения лиофилизата физиологический раствор или раствор глюкозы.

Фосфоглив

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

При нарушениях функции печени

С *осторожностью* следует назначать пациентам с портальной гипертензией.

Применение в детском возрасте

Применяют у **детей старше 12 лет**.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в недоступном для детей и защищенном от света месте при температуре не выше 20°C. Срок годности капсул - 3 года, срок годности лиофилизата - 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Fosfogliv>