

## Фосфомицин



### **Код АТХ:**

- [J01XX01](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Фосфомицин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Фармакотерапевтическая группа:**

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

### **Показания к применению:**

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний (вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами) нижних отделов мочевыводящих путей, в т.ч. острый бактериальный цистит, обострение хронического рецидивирующего бактериального цистита, острый бактериальный урвезикальный синдром, бактериальный неспецифический уретрит, бессимптомная массивная бактериурия (при беременности), послеоперационная инфекция мочевых путей. Профилактика инфекции мочевых путей при хирургических вмешательствах и трансуретральных диагностических обследованиях.

### **Относится к болезням:**

- [Инфекции](#)
- [Уретрит](#)
- [Цистит](#)

### **Противопоказания:**

Повышенная чувствительность к фосфомицину, беременность.

### **Способ применения и дозы:**

Принимают внутрь. Разовая доза для взрослых - 3 г, для детей - 2 г. Схема лечения устанавливается индивидуально, с учетом стадии воспалительного процесса, реактивности организма больного, чувствительности микроорганизмов к фосфомицину.

**Побочное действие:**

*Редко:* тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь, исчезающая самостоятельно после отмены фосфомицина.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Фосфомицин противопоказан к применению при беременности.

В период лактации применение фосфомицина возможно только в случаях крайней необходимости под наблюдением врача.

**Особые указания и меры предосторожности:**

У грудных детей применение фосфомицина возможно только в случаях крайней необходимости под наблюдением врача.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Fosfomicin>