# Фосфомицин Эспарма



## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

***Форма выпуска, описание и состав***

***Порошок для приготовления раствора для приема внутрь*** белого или почти белого цвета, гомогенный, с фруктовым запахом, без агломератов и посторонних частиц.

| | **1 пакет** |
|---|---|
| фосфомицина трометамол | 5.631 г, |
| что соответствует содержанию фосфомицина | 3 г |

Вспомогательные вещества: сахароза - 2.244 г, ароматизатор апельсиновый - 0.065 г, ароматизатор мандариновый - 0.05 г, сахарин натрия - 0.01 г.

8 г - пакетики из трехслойного материала (1) - пачки картонные.

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Антибиотик широкого спектра действия. Механизм действия связан с подавлением первого этапа синтеза пептидогликана клеточной стенки бактерий. Являясь структурным аналогом фосфоэнола пирувата, вступает в конкурентное взаимодействие с ферментом N-ацетил-глюкозамино-3-о-энолпирувил-трансферазой, в результате этого происходит специфическое, избирательное и необратимое ингибирование этого фермента.

Активен в отношении большинства грамотрицательных бактерий: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae; грамположительных бактерий: Staphylococcus spp. (в т.ч. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis), Streptococcus spp. (в т.ч. Enterococcus faecalis).

***Фармакокинетика***

Абсорбция составляет 60%; связывание с белками плазмы - 10%. $C_{max}$ при приеме внутрь в дозе 50 мг/кг - 32 мкг/мл; при в/в введении в дозе 20 мг/кг - 130 мкг/кг; $T_{1/2}$ - 2.2 ч. Быстро проникает и хорошо распределяется в тканях. 90% выделяется почками с созданием высоких концентраций в моче.

## Показания к применению:

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний (вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами) нижних отделов мочевыводящих путей, в т.ч. острый бактериальный цистит, обострение хронического рецидивирующего бактериального цистита, острый бактериальный уровезикальный синдром, бактериальный

неспецифический уретрит, бессимптомная массивная бактериурия (при беременности), послеоперационная инфекция мочевых путей. Профилактика инфекции мочевых путей при хирургических вмешательствах и трансуретральных диагностических обследованиях.

## Относится к болезням:

- Инфекции
- Уретрит
- Цистит

## Противопоказания:

Повышенная чувствительность к фосфомицину, беременность.

## Способ применения и дозы:

Принимают внутрь. Разовая доза для взрослых - 3 г, для детей - 2 г. Схема лечения устанавливается индивидуально, с учетом стадии воспалительного процесса, реактивности организма больного, чувствительности микроорганизмов к фосфомицину.

## Побочное действие:

*Редко:* тошнота, рвота, диарея, кожная сыпь, исчезающая самостоятельно после отмены фосфомицина.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Фосфомицин противопоказан к применению при беременности.

В период лактации применение фосфомицина возможно только в случаях крайней необходимости под наблюдением врача.

## Особые указания и меры предосторожности:

Диагнозы

- Аденома предстательной железы
- Баланит, баланопостит, фимоз
- Варикоцеле
- Гидронефроз

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Fosfomicin_Esparma