Фридерм цинк

Код АТХ:

- D11AC

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Пиритион цинка

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Шампунь***	**1 мл**	**1 фл.**
пиритион цинк суспензии 2%	20 мг	3 г

Вспомогательные вещества: триэтаноламина лаурил сульфат, полиэтиленгликоль-8-дистеарат, моноэтаноламина кокамид, диэтаноламина кокамид, натрия хлорид, камедь, гидроксипропилметилцеллюлоза, вода дистиллированная.

150 мл - флаконы пластиковые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат для наружного применения в дерматологии. Оказывает противомикробное и противогрибковое действие. *Активен в отношении* стрептококков, стафилококков, грибов (в т.ч. Pityrosporum orbiculare). Устраняет симптомы себореи и перхоть.

Фармакокинетика

Препарат предназначен для наружного применения, данных о системной абсорбции не имеется.

Показания к применению:

— себорейный дерматит волосистой части головы, сопровождающийся перхотью и зудом;

— атопический дерматит;

— отрубевидный (разноцветный) лишай;

— диффузное поредение волос (в составе комплексной терапии).

Относится к болезням:

- Дерматит
- Зуд
- Лишай
- Порезы
- Себорея

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Перед применением шампунь следует тщательно взболтать.

Небольшое количество (в зависимости от длины волос) шампуня наносят на мокрые волосы и тщательно втирают в кожу до образования пены, затем смывают и наносят шампунь вновь. Пену на голове оставляют приблизительно на 5 мин, затем тщательно промывают волосы.

Препарат рекомендуют применять 2 раза в неделю в течение первых 2 недель лечения, затем 1-2 раза в неделю в течение 1.5-2 мес. При необходимости курс лечения можно повторять.

Побочное действие:

При применении препарата по показаниям в рекомендуемых дозах побочное действие не выявлено.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Фридерм цинк не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности Фридерм цинк может быть использован без каких-либо ограничений.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимого взаимодействия препарата Фридерм цинк с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Особые указания и меры предосторожности:

В перерывах между курсами лечения шампунем Фридерм цинк, а также после достижения желаемого эффекта от его применения рекомендуется использовать шампунь Фридерм pH-баланс.

Шампунь Фридерм цинк не содержит искусственных красителей, отдушек и консервантов.

Препарат предназначен только для наружного применения. При попадании шампуня в глаза смыть чистой водой.

Условия хранения:

Препарат следует хранить при температуре от 2° до 30°C.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Friderm_Cink