


Фторокорт



Код АТХ:

- [D07AB09](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Триамцинолон](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Мазь для наружного применения 0.1%** белого или почти белого цвета, однородная, практически без запаха.

	1 г
триамцинолона ацетонид	1 мг

Вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат, стеариновая кислота, полисорбат 60, цетиловый спирт, парафин жидкий, глицерол 85%, вода очищенная.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

ГКС для местного применения. Тормозит высвобождение интерлейкина -1,2, гамма-интерферона из лимфоцитов и макрофагов. Индуцирует образование липокортинов, угнетает высвобождение эозинофилами медиаторов

воспаления, снижает количество и стабилизирует мембраны тучных клеток. Накапливаясь в эпидермисе, снижает зуд и экссудацию. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, противоотечное действие.

Фармакокинетика

Триамцинолон плохо всасывается при наружном применении и не оказывает существенного системного действия. Нарушение целостности кожных покровов или окклюзионная повязка могут повысить всасывание триамцинолона.

Показания к применению:

- экзема;
- атопический дерматит (нейродермит);
- псориаз;
- дерматиты различной этиологии (в т.ч. аллергические);
- фотодерматозы;
- гипертрофические и келоидные рубцы;
- красный плоский лишай;
- дискоидная красная волчанка;
- укусы насекомых.

Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Волчанка](#)
- [Дерматит](#)
- [Лишай](#)
- [Нейродермит](#)
- [Псориаз](#)
- [Фотодерматоз](#)
- [Экзема](#)

Противопоказания:

- бактериальные, вирусные и грибковые заболевания кожи;
- туберкулез кожи;
- кожные проявления сифилиса;
- периоральный дерматит;
- опухоли и предраковые заболевания кожи;
- повышенная чувствительность.

Способ применения и дозы:

Наружно. Мазь наносят на пораженные участки кожи тонким слоем 2-3 раза/сут (не более 15 г/сут).

Мазь можно применять под окклюзионную повязку при *лихенифицированных проявлениях* (не более 10 г/сут).

Курс лечения - обычно 5-10 дней, при *упорном течении* - до 25 дней, не рекомендуется применение более 4 недель.

Побочное действие:

Местные реакции: возможно развитие эритемы, гипертрихоза, развитие вторичных инфекционных поражений

Фторокорт

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

(присоединение бактериальной и грибковой инфекции). При длительном применении или нанесении на обширные участки кожи возможны системные побочные эффекты, характерные для ГКС и атрофические изменения кожи.

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применять при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Действие пероральных ГКС на фоне местного применения триамцинолона усиливается.

Особые указания и меры предосторожности:

Не рекомендуется наносить на большие поверхности, избегать длительного применения у детей независимо от возраста.

Не применять в офтальмологии, не наносить на кожу лица.

Для профилактики местных инфекционных осложнений возможно применение в сочетании с противомикробными средствами.

Применение в детском возрасте

Не рекомендуется наносить на большие поверхности, избегать длительного применения у детей независимо от возраста.

Условия хранения:

Хранить при температуре 8-15°C, в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Ftorokort>