

## Фуцикорт



### Код АТХ:

- [D07CC01](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Бетаметазон](#)
- [Фузидовая кислота](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН МНН</sup>  
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Крем для наружного применения** однородный, белого цвета.

	<b>1 г</b>
фузидовой кислоты гемигидрат	20.4 мг,
что соответствует содержанию фузидовой кислоты безводной	20 мг
бетаметазона валерат	1.214 мг,
что соответствует содержанию бетаметазона	1 мг

**Вспомогательные вещества:** макроглола цетостеарат - 18 мг, цетостеариловый спирт (цетиловый спирт - 60%, стеариловый спирт - 40%) - 72 мг, хлорокрезол - 1 мг, натрия дигидрофосфата дигидрат - 3 мг, парафин жидкий - 60 мг, парафин мягкий белый (содержит около 10 ppm  $\alpha$ -токоферола) - 150 мг, натрия гидроксид - q.s., вода очищенная - до 1 г.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
30 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.  
60 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.

### Фармакотерапевтическая группа:

- [Гормоны и их антагонисты](#)

## Фармакологические свойства:

### Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения, содержащий антибиотик полициклической структуры и ГКС.

Фузидовая кислота - антибиотик полициклической структуры. *Активен преимущественно в отношении грамположительных бактерий*, в частности - *Staphylococcus aureus*, *Propionibacterium acnes* и коринебактерий. Механизм действия связан с подавлением синтеза белка бактерий. После 30 лет применения устойчивость бактерий к фузидовой кислоте отмечается редко (1-3%). Чаще всего бактерии, устойчивые к пенициллину и другим антибиотикам, чувствительны к фузидовой кислоте.

Бетаметазон относится к группе сильных ГКС (группа III) и оказывает фармакологическое действие, подавляя местные иммунные реакции, в т.ч. вазодилатацию, отечность и болезненные ощущения.

### Фармакокинетика

#### Всасывание

Системное всасывание фузидовой кислоты является незначительным.

При нанесении на кожу всасывание бетаметазона может приводить к системным эффектам, особенно при нанесении на обширные участки воспаленной кожи или под окклюзионные повязки. При наружном нанесении препарата Фуцикорт всасывание бетаметазона через неповрежденную кожу составляет менее 2%.

#### Метаболизм и выведение

После всасывания бетаметазон метаболизируется в печени и выводится почками.

## Показания к применению:

Инфекционно-воспалительные заболевания кожи, вызванные микроорганизмами, чувствительными к фузидовой кислоте:

- дерматиты;
- инфицированная аллергическая экзема;
- токсидермия.

## Относится к болезням:

- [Аллергия](#)
- [Дерматит](#)
- [Токсидермия](#)
- [Экзема](#)

## Противопоказания:

- розацеа;
- периоральный дерматит;
- юношеские угри;
- первичные бактериальные, вирусные и грибковые кожные заболевания;
- туберкулез кожи;
- кожные проявления сифилиса;
- детский возраст до 1 года;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Применяют наружно.

**Взрослым и детям** наносят крем тонким слоем на пораженный участок 2-3 раза/сут. Курс лечения - не более 2 недель.

## Побочное действие:

Определение частоты побочных реакций: очень часто (> 1/10), часто (> 1/100 и <1/10), нечасто (>1/1000 и <1/100), редко (>1/10 000 и <1/1000), очень редко (< 1/10 000).

*Со стороны кожных покровов и придатков кожи:* нечасто - сыпь, обострение экземы, раздражение кожи, кожный зуд, ощущение жжения или покалывания кожи; частота неизвестна - атрофия кожи, контактный дерматит, эритема, сухость кожи.

Хотя данные реакции не отмечались в клинических исследованиях препарата Фуцикорт, наружное применение ГКС может приводить к телеангиэктазиям и стриям, особенно при длительном применении.

Как и при применении других ГКС, возможны фолликулит (стероидные угри), гипертрихоз, периоральный дерматит, депигментация, геморрагическая сыпь, розовые угри, потница, мацерация кожи, системные эффекты ГКС.

*Аллергические реакции:* частота неизвестна - крапивница.

## Передозировка:

*Симптомы:* вследствие чрезмерного, длительного наружного применения ГКС возможно подавление функции гипофиза и надпочечников, что может привести к вторичной (обычно обратимой) недостаточности функции надпочечников.

*Лечение:* проведение симптоматической терапии.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Клинические данные в отношении применения препарата Фуцикорт при беременности и лактации отсутствуют.

В *экспериментальных исследованиях* на животных тератогенное действие фузидовой кислоты не наблюдалось, но отмечалось при применении ГКС.

Безопасность наружного применения кортикостероидов при беременности не установлена. Применение кортикостероидов при беременности возможно только в том случае, когда ожидаемая польза терапии для матери превышает любой потенциальный риск для плода. У данной категории пациентов кортикостероиды не следует применять в высоких дозах или в течение длительного времени.

Возможно применение препарата Фуцикорт в период лактации только по рекомендации врача.

ГКС выделяются с грудным молоком, но вероятность их воздействия на грудного ребенка очень мала при наружном нанесении на ограниченный участок кожи. Если показано длительное лечение или применение препарата в высоких дозах, следует прекратить грудное вскармливание. В период лактации не следует наносить крем на молочные железы.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Фуцикорт не известно.

## Особые указания и меры предосторожности:

С осторожностью следует применять препарат при перианальном или генитальном зуде; на обширных участках кожи, под окклюзионными повязками, лице, участках опрелости; в периорбитальной области, т.к. при этом возможно развитие глаукомы.

Отмечается бактериальная устойчивость, связанная с применением фузидовой кислоты.

Как и при применении других антибиотиков, чрезмерное или неоднократное применение препарата может увеличить риск развития устойчивости к антибиотикам.

Не наносить препарат на открытые раны и слизистые оболочки.

Если применение крема Фуцикорт вызывает раздражение или чрезмерную чувствительность кожи, следует прекратить его использование и начать другое соответствующее лечение.

В случае прекращения лечения возможно появление синдрома отмены, проявляющегося в виде покраснения, ощущения жжения или покалывания кожи или обострения псориаза. Данные явления можно предотвратить при постепенной отмене препарата.

После длительного наружного лечения сильнодействующими кортикостероидами атрофические изменения наиболее часто встречаются на лице, наружных половых органах, внутренней стороне верхних и нижних конечностей, по сравнению с другими участками.

Препарат содержит хлорокрезол, который может вызывать аллергические реакции, а также цетостеариловый спирт, который может вызывать местные кожные высыпания (например, контактный дерматит).

#### *Использование в педиатрии*

В связи с тем, что у детей величина соотношения площади поверхности и массы тела больше, чем у взрослых, дети подвержены большему риску подавления функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и развития синдрома Кушинга при применении любых ГКС для наружного применения. Длительное лечение детей ГКС может привести к нарушениям роста и развития организма.

При лечении детей препарат следует применять в минимальной эффективной дозе.

#### *Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Препарат не влияет на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.

#### **Применение в детском возрасте**

Противопоказан в детском возрасте до 1 года.

В связи с тем, что у детей величина соотношения площади поверхности и массы тела больше, чем у взрослых, дети подвержены большему риску подавления функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и развития синдрома Кушинга при применении любых ГКС для наружного применения. Длительное лечение детей ГКС может привести к нарушениям роста и развития организма.

При лечении детей препарат следует применять в минимальной эффективной дозе.

## **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 3 года.

## **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Fucikort>