

Фугентин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гентамицин](#)
- [Фузидовая кислота](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Гентамицин - антибиотик группы аминогликозидов, *активен в отношении* большинства грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Proteus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Serratia spp.*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*), *умеренно активен в отношении* *Staphylococcus spp.*

Фузидин, обладая узким спектром антибактериального действия, усиливает активность гентамицина в отношении *Staphylococcus spp.* (в т.ч. устойчивых к другим антибиотикам), *активен также в отношении* *Corynebacterium spp.*, *Peptostreptococcus spp.*, *Propionibacterium spp.*, *Haemophilus influenzae*.

Фармакокинетика

При местном применении практически не всасывается в системный кровоток.

Показания к применению:

- гнойно-воспалительные заболевания уха, носа и его придаточных пазух (наружный отит, евстахиит, ринит, синуситы);
- хронический тонзиллит;
- с профилактической целью - оперативные вмешательства на придаточных пазухах носа.

Относится к болезням:

- [Евстахиит](#)
- [Ринит](#)
- [Синусит](#)
- [Тонзиллит](#)

Противопоказания:

- перфорация барабанной перепонки;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Местно. При *гнойно-воспалительных заболеваниях уха* препарат закапывают в слуховой проход **взрослым** по 2-5 капли, **детям** - по 1-2 капли 3 раза/сут или закладывают в наружный слуховой проход тампон, смоченный препаратом; при *рините* закапывают в каждый носовой ход **взрослым** - по 2-3 капли, **детям** - по 1-2 капли 3 раза/сут.

При *воспалительных заболеваниях придаточных пазух носа* 1.5-5 мл препарата вводят в придаточные полости носа после предварительной санации путем их прокола.

При *лечении хронических тонзиллитов* 2-3 мл препарата растворяют в 100-200 мл дистиллированной воды или 0.9% раствора натрия хлорида. С помощью специального шприца с длинной изогнутой канюлей, конец которой вводится в устье лакун, проводится их промывание. Курс лечения - 5-14 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции (кожные высыпания); чувство жжения (при нанесении на пораженный участок кожи и слизистую оболочку, быстро проходит и не препятствует продолжению лечения).

Источник: <http://drugs.thead.ru/Fugentin>