Фугентин



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Гентамицин
- Фузидовая кислота

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн] [мнн] Википедия[мнн] [мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат. Гентамицин - антибиотик группы аминогликозидов, *активен в отношении* большинства грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Salmonella spp., Staphylococcus spp.), *умеренно активен в отношении* Staphylococcus spp.

Фузидин, обладая узким спектром антибактериального действия, усиливает активность гентамицина в отношении Staphylococcus spp. (в т.ч. устойчивых к другим антибиотикам), *активен также в отношении* Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Propionibacterium spp., Haemophilus influenzae.

Фармакокинетика

При местном применении практически не всасывается в системный кровоток.

Показания к применению:

— гнойно-воспалительные заболевания уха, носа и его придаточных пазух (наружный отит, евстахиит, ринит, синуситы);

— хронический тонзиллит;

— с профилактической целью - оперативные вмешательства на придаточных пазухах носа.

Относится к болезням:

- Евстахиит
- Ринит
- Синусит
- Тонзиллит

Противопоказания:

— перфорация барабанной перепонки;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Местно. При *гнойно-воспалительных заболеваниях уха* препарат закапывают в слуховой проход **взрослым** по 2-5 капли, **детям** - по 1-2 капли 3 раза/сут или закладывают в наружный слуховой проход тампон, смоченный препаратом; при *рините* закапывают в каждый носовой ход **взрослым** - по 2-3 капли, **детям** - по 1-2 капли 3 раза/сут.

При *воспалительных заболеваниях придаточных пазух носа* 1.5-5 мл препарата вводят в придаточные полости носа после предварительной санации путем их прокола.

При *лечении хронических тонзиллитов* 2-3 мл препарата растворяют в 100-200 мл дистиллированной воды или 0.9% раствора натрия хлорида. С помощью специального шприца с длинной изогнутой канюлей, конец которой вводится в устье лакун, проводится их промывание. Курс лечения - 5-14 дней.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции (кожные высыпания); чувство жжения (при нанесении на пораженный участок кожи и слизистую оболочку, быстро проходит и не препятствует продолжению лечения).

Источник: http://drugs.thead.ru/Fugentin