

## Фурацилин-СФ



### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Нитрофурал](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### **Форма выпуска:**

#### **Форма выпуска, описание и состав**

◇ **Раствор для местного и наружного применения** прозрачный, желтого цвета.

	<b>1 л</b>
нитрофурал	0.2 г

Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 9 г, вода д/и - до 1 л.

500 мл - бутылки полимерные (1) - пачки картонные.

500 мл - бутылки полимерные (16) - коробки картонные (для стационаров).

500 мл - контейнеры (1) для инфузионных растворов - пакеты полимерные.

500 мл - контейнеры (1) для инфузионных растворов - пакеты полимерные (18) - коробки картонные (для стационаров).

1000 мл - контейнеры (1) для инфузионных растворов - пакеты полимерные.

1000 мл - контейнеры (1) для инфузионных растворов - пакеты полимерные (6) - коробки картонные (для стационаров).

2000 мл - контейнеры (1) для инфузионных растворов - пакеты полимерные.

2000 мл - контейнеры (1) для инфузионных растворов - пакеты полимерные (4) - коробки картонные (для стационаров).

### **Фармакологические свойства:**

#### **Фармакодинамика**

Противомикробное средство, производное нитрофурана. Активен в отношении грамположительных бактерий: *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Bacillus anthracis*; грамотрицательных бактерий: *Escherichia coli*, *Shigella* spp., *Salmonella* spp. (в т.ч. *Salmonella paratyphi*).

### **Показания к применению:**

Гнойные раны, пролежни, язвы, ожоги II и III степени, остеомиелит, эмпиема плевры, анаэробная инфекция раневой поверхности, фурункул наружного слухового прохода, эмпиема придаточных пазух носа.

**Относится к болезням:**

- [Инфекции](#)
- [Ожоги](#)
- [Остеомиелит](#)
- [Плеврит](#)
- [Пролежни](#)
- [Раны](#)
- [Фурункул](#)
- [Эмпиема](#)
- [Эмпиема плевры](#)

**Противопоказания:**

Аллергические дерматозы, повышенная чувствительность к нитрофуралу и другим производным нитрофурана.

**Способ применения и дозы:**

Диагнозы

- Ангина
- Боли в горле
- Заболевания уха
- Ларингит

**Побочное действие:**

*Возможно:* местные аллергические реакции, дерматиты.

**Особые указания и меры предосторожности:**

Для приготовления водного раствора 1 часть нитрофурала растворяют в 5000 частей изотонического раствора натрия хлорида или дистиллированной воды. Готовый раствор можно хранить в течение длительного времени.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Furacilin-SF>