Фурацилин-СФ



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Нитрофурал

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◊ ***Раствор для местного и наружного применения*** прозрачный, желтого цвета.

	1 л
нитрофурал	0.2 г

Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 9 г, вода д/и - до 1 л.

500 мл - бутылки полимерные (1) - пачки картонные.
500 мл - бутылки полимерные (16) - коробки картонные (для стационаров).
500 мл - контейнеры (1) для инфузионных растворов - пакеты полимерные.
500 мл - контейнеры (1) для инфузионных растворов - пакеты полимерные (18) - коробки картонные (для стационаров).
1000 мл - контейнеры (1) для инфузионных растворов - пакеты полимерные.
1000 мл - контейнеры (1) для инфузионных растворов - пакеты полимерные (6) - коробки картонные (для стационаров).
2000 мл - контейнеры (1) для инфузионных растворов - пакеты полимерные.
2000 мл - контейнеры (1) для инфузионных растворов - пакеты полимерные (4) - коробки картонные (для стационаров).

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противомикробное средство, производное нитрофурана. Активен в отношении грамположительных бактерий: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus anthracis; грамотрицательных бактерий: Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella spp. (в т.ч. Salmonella paratyphi).

Показания к применению:

Гнойные раны, пролежни, язвы, ожоги II и III степени, остеомиелит, эмпиема плевры, анаэробная инфекция раневой поверхности, фурункул наружного слухового прохода, эмпиема придаточных пазух носа.

Относится к болезням:

- Инфекции
- Ожоги
- Остеомиелит
- Плеврит
- Пролежни
- Раны
- Фурункул
- Эмпиема
- Эмпиема плевры

Противопоказания:

Аллергические дерматозы, повышенная чувствительность к нитрофуралу и другим производным нитрофурана.

Способ применения и дозы:

Диагнозы

- Ангина
- Боли в горле
- Заболевания уха
- Ларингит

Побочное действие:

Возможно: местные аллергические реакции, дерматиты.

Особые указания и меры предосторожности:

Для приготовления водного раствора 1 часть нитрофурала растворяют в 5000 частей изотонического раствора натрия хлорида или дистиллированной воды. Готовый раствор можно хранить в течение длительного времени.

Источник: http://drugs.thead.ru/Furacilin-SF