

[Фурацилиновая Мазь 10%](#)



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противомикробное средство, производное нитрофурана. Активен в отношении грамположительных бактерий: *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Bacillus anthracis*; грамотрицательных бактерий: *Escherichia coli*, *Shigella* spp., *Salmonella* spp. (в т.ч. *Salmonella paratyphi*).

Показания к применению:

Гнойные раны, пролежни, язвы, ожоги II и III степени, остеомиелит, эмпиема плевры, анаэробная инфекция раневой поверхности, фурункул наружного слухового прохода, эмпиема придаточных пазух носа.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Ожоги](#)
- [Остеомиелит](#)
- [Плеврит](#)
- [Пролежни](#)
- [Раны](#)
- [Фурункул](#)
- [Эмпиема](#)
- [Эмпиема плевры](#)

Противопоказания:

Аллергические дерматозы, повышенная чувствительность к нитрофуралу и другим производным нитрофурана.

Способ применения и дозы:

При гнойных ранах, пролежнях, язвах, ожогах, для подготовки гранулирующей поверхности к пересадкам кожи и к наложению вторичного шва орошают рану водным раствором нитрофурала и накладывают влажные повязки. При остеомиелите после операции промывают полость водным раствором нитрофурала и накладывают влажную повязку. При эмпиеме плевры отсасывают гной и промывают плевральную полость с последующим введением в полость

20-100 мл водного раствора нитрофурала.

Побочное действие:

Возможно: местные аллергические реакции, дерматиты.

Особые указания и меры предосторожности:

Для приготовления водного раствора 1 часть нитрофурала растворяют в 5000 частей изотонического раствора натрия хлорида или дистиллированной воды. Готовый раствор можно хранить в течение длительного времени.

Источник: http://drugs.thead.ru/Furacilinovaya_Maz_10