

[Фурагин](#)



Код АТХ:

- [J01XE](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Фуразидин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Таблетки	1 таб.
фуразидин	50 мг

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — антибактериальное широкого спектра.

Фармакодинамика

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в т.ч. резистентных к сульфаниламидам и антибиотикам. Устойчивость микроорганизмов развивается медленно.

Показания к применению:

— лечение инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей;

— лечение вторичных инфекционных осложнений после оперативных вмешательств на органах мочеполовой системы.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

Противопоказания:

- нарушение функции почек;
 - нарушение функции печени;
 - детский возраст 1 года;
 - беременность;
 - лактация;
 - повышенная чувствительность к производным нитрофурана.
- С осторожностью при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

Способ применения и дозы:

Фурагин применяют внутрь по 50-200 мг 2-3 раза/сут после еды в течение 7-10 дней; при необходимости можно провести повторный курс лечения через 10-15 сут.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, снижение аппетита, нарушение функций печени.

Со стороны ЦНС: головокружение, головная боль, развитие полиневритов.

Аллергические реакции: крапивница, кожный зуд.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано при беременности. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Нет данных.

Особые указания и меры предосторожности:

Для предупреждения побочных эффектов назначают обильное питье.

Для профилактики развития невритов необходимо назначать витамины группы В.

Условия хранения:

Список Б. В сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Furagin>