

## Фурамаг



### Код АТХ:

- [J01XE](#)

### Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Фуразидин](#)

### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)<sup>МНН</sup> [Википедия](#)<sup>МНН</sup>

[PLC VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

Капсулы, 25 мг, 50 мг. По 10 капс. в контурной ячейковой упаковке. По 2, 3, 4 или 5 контурных ячейковых упаковок в пачке из картона.

### Состав:

Капсулы	1 капс.
фуразидин калия	25 мг
	50 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> калия карбонат — 6,3/12,6 мг; магния гидроксикарбонат — 25/50 мг; тальк — 1,5/3 мг	
<i>капсула 25 мг:</i> желатин — 96,27%; краситель железа оксид желтый (E172) — 0,73%; титана диоксид (E171) — 3%	

## Фурамаг

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

капсула 50 мг: желатин — 97,48%; краситель хинолиновый желтый (E104) — 1,2%; титана диоксид (E171) — 1,32%	
--	--

## Описание:

Капсулы по 25 мг: твердые желатиновые капсулы № 4, коричневато-желтого цвета.

Капсулы по 50 мг: твердые желатиновые капсулы №3, желтого цвета.

Содержимое капсул: порошок от оранжево-коричневого до красновато-коричневого цвета, допускается наличие частиц белого, желтого, оранжевого и оранжево-коричневого цвета.

## Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

## Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — противомикробное.

### Фармакодинамика

Противомикробное средство широкого спектра действия, относящееся к группе нитрофуранов.

Резистентность к Фурамагу развивается медленно и не достигает высокой степени.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микробов, патогенных штаммов *Staphylococcus spp.* и других микроорганизмов, резистентных к антибиотикам.

Эффективен в отношении грамположительных кокков (стрепто-, стафилококков), грамотрицательных палочек (эшерихий коли, сальмонелл, шигелл, протей, клебсиелл, энтеробактерий), простейших (лямблий). По отношению к *Staphylococcus spp.*, *E.coli*, *Aerobacter aerogenes*, *Bact. citrovorum*, *Proteus mirabilis*, *Proteus morganii* Фурамаг<sup>®</sup>, по сравнению с другими нитрофуранами, более активен. Фурамаг<sup>®</sup> проявляет более высокую активность к *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus spp.* по сравнению с другими группами антимикробных препаратов.

Против большей части бактерий бактериостатическая концентрация составляет от 1:100 000 до 1:200 000; бактерицидная — примерно в 2 раза больше. Под влиянием нитрофуранов в микроорганизмах происходит подавление дыхательной цепочки и цикла трикарбоновых кислот (цикла Кребса), а также угнетение других биохимических процессов в микроорганизмах, в результате чего происходит разрушение их оболочки или цитоплазматической мембраны. В результате действия нитрофуранов микроорганизмы выделяют меньше токсинов, в связи с чем улучшение общего состояния больного возможно еще до выраженного подавления роста микрофлоры. Нитрофураны, в отличие от многих других противомикробных средств, не только не угнетают иммунную систему организма, а наоборот активизируют ее (повышают титр комплемента и способность лейкоцитов фагоцитировать микроорганизмы). Нитрофураны в терапевтических дозах стимулируют лейкопоэз.

## Показания к применению:

Инфекции, вызванные чувствительными к фуразидину микроорганизмами:

- урогенитальные инфекции (острые циститы, уретриты, пиелонефриты);
- гинекологические инфекции;
- инфекции кожи и мягких тканей;
- тяжелые инфицированные ожоги;
- с профилактической целью при урологических операциях (в т.ч. цистоскопии, катетеризации).

## Относится к болезням:

- [Инфекции](#)

- [Ожоги](#)
- [Пиелит](#)
- [Пиелонефрит](#)
- [Уретрит](#)
- [Цистит](#)

## Противопоказания:

- хроническая почечная недостаточность тяжелой степени;
- беременность;
- период лактации (грудного вскармливания);
- детский возраст до 3 лет (для данной лекарственной формы);
- повышенная чувствительность к препаратам нитрофурановой группы.

С осторожностью применяют препарат при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

## Способ применения и дозы:

Препарат следует принимать внутрь после еды, запивая большим количеством жидкости.

**Взрослым** назначают по 50-100 мг 3 раза/сут.

**Детям** назначают по 25-50 мг 3 раза/сут (но не более 5 мг/кг массы тела в сут).

Курс лечения 7-10 дней. При необходимости повторения курса лечения следует сделать перерыв в течение 10-15 дней.

Для профилактики инфекции при урологических операциях, цистоскопии, катетеризации и т.д. препарат назначают **взрослым** по 50 мг, **детям** - по 25 мг однократно за 30 мин до процедуры.

В случае пропуска приема препарата, очередную дозу следует принять в обычное время. Не принимать удвоенную дозу для компенсации пропущенной дозы.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* редко - тошнота, рвота, потеря аппетита, нарушения функции печени.

*Со стороны ЦНС и периферической нервной системы:* редко - головная боль, головокружение, полиневрит.

*Аллергические реакции:* редко - кожная сыпь (в т.ч. папулезные высыпания).

Фурамаг малотоксичен.

## Передозировка:

*Симптомы:* проявления нейротоксического характера, атаксия, тремор.

*Лечение:* следует выпить большое количество жидкости. Для купирования острых симптомов применяют антигистаминные препараты. Для профилактики невритов возможно назначение витаминов (тиамина бромид).

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не следует применять Фурамаг одновременно с ристомицином, хлорамфениколом, сульфаниламидами (повышается риск угнетения кроветворения).

Не рекомендуется одновременно с нитрофуранами назначать препараты, способные подкислять мочу (в т.ч. аскорбиновую кислоту, кальция хлорид).

### **Особые указания и меры предосторожности:**

Для уменьшения вероятности развития побочных эффектов Фурамаг запивают большим количеством жидкости.

При появлении побочных эффектов применение препарата следует прекратить (токсические явления чаще проявляются у пациентов со сниженной выделительной функцией почек).

Пациент должен информировать врача о любых побочных эффектах, возникающих во время лечения препаратом.

В период лечения пациенту рекомендуется воздержаться от употребления алкогольных напитков, поскольку возможно усиление побочных эффектов.

*Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами*

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами не отмечено.

### **Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 3 года.

### **Условия отпуска в аптеке:**

По рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Furamag>