Фурасол



Код АТХ:

- D06BX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Фуразидин

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения оранжевато-коричневого цвета, крупный.

	1 пак. (1 г)
фуразидин калия	100 мг

Вспомогательные вещества: натрия хлорид - 900 мг.

1 г - пакетики из ламината (15) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Противомикробный препарат, производное нитрофурана. *Эффективен в отношении* грамположительных кокков (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.), грамотрицательных палочек (Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp.,

Klebsiella spp.). *Устойчивы* Acinetobacter spp., большинство штаммов Proteus spp., Serratia spp.

Механизм действия связан с ингибированием синтеза нуклеиновых кислот. В зависимости от концентрации оказывает бактерицидное или бактериостатическое действие. Против большей части бактерий бактериостатическая концентрация составляет от 10-20 мкг/мл. Бактерицидная концентрация примерно в 2 раза выше.

Под влиянием нитрофуранов в микроорганизмах происходит подавление активности дыхательной цепи и цикла трикарбоновых кислот (цикла Кребса), а также угнетение других биохимических процессов, что приводит к разрушению их оболочки или цитоплазматической мембраны. Нитрофураны повышают титр комплемента и способность лейкоцитов фагоцитировать микроорганизмы.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Фурасол не предоставлены.

Показания к применению:

При комплексном лечении:

— инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта, ротоглотки;

— инфицированных ран.

Относится к болезням:

- Инфекции

Противопоказания:

— аллергический дерматит;

— беременность;

— период лактации (кормления грудью);

— детский возраст до 4 лет;

— повышенная чувствительность к фуразидину или препаратам нитрофуранового ряда.

Способ применения и дозы:

Препарат предназначен для местного и наружного применения.

Раствор готовят непосредственно перед применением.

Содержимое пакетика растворяют в 200 мл горячей воды и теплый раствор используют для полоскания полости рта и ротоглотки 2-3 раза/сут.

Раствор препарата также применяют для промывания ран; после хирургической обработки наносят непосредственно на раневую поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку, или на перевязочный материал, а затем на рану. Наносить на раневую поверхность 2-3 раза/сут.

Побочное действие:

В отдельных случаях возможно развитие аллергических реакций.

Передозировка:

Препарат малотоксичен. Случаи передозировки не описаны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

В сочетании с антибиотиками проявляет синергизм.

В случае употребления алкоголя во время лечения препаратом, возрастает вероятность развития кожных аллергических реакций.

Особые указания и меры предосторожности:

В случае развития аллергических реакций применение препарата прекращают. Назначают симптоматическую терапию.

Раствор готовят непосредственно перед применением. Приготовленный раствор нельзя хранить.

Применение в детском возрасте

Не использовать для детей младше 4-х лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от 15° до 25°С.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Furasol