

## Фузидин-Натрий



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)  
[Госреестр](#) [Википедия](#)  
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Форма выпуска, описание и состав**

<b>Таблетки, покрытые оболочкой</b>	<b>1 таб.</b>
фузидина натриевая соль	125 мг
"	250 мг

*Вспомогательные вещества:* ПВП, магния стеарат, сахар молочный, АФЦ, кислотный красный 2С, масло касторовое, титана диоксид.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.  
20 шт. - банки темного стекла (1) - пачки картонные.  
20 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

### Показания к применению:

- септицемия;
- пневмония;
- отит;
- абсцессы;
- флегмоны;
- фурункулез;
- инфицированные раны и ожоги;
- инфекции мягких тканей;
- остеомиелит;
- гонорея, вызванная штаммами, устойчивыми к бензилпенициллину, или при повышенной чувствительности пациента к бензилпенициллину.

### Относится к болезням:

- [Ожоги](#)
- [Раны](#)

## Противопоказания:

—повышенная чувствительность к компонентам препарата.

## Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь после приема пищи.

Для **взрослых** разовая доза составляет 500 мг, суточная доза – 1.5 г (в 3 приема с интервалами 8 ч).

При *тяжелых инфекциях* назначают в первые 1-2 дня 2-3 г/сут, затем дозу уменьшают до 1.5 г/сут. Продолжительность курса лечения – 7-14 дней, при *остеомиелите* – 2-3 недели.

**Детям** препарат назначают из расчета 40-60 мг/кг массы тела/сут, при *тяжелых инфекциях* - до 80 мг/кг/сут.

## Побочное действие:

*Со стороны пищеварительной системы:* боль в животе, тошнота, рвота, диарея.

*Аллергические реакции:* гиперемия слизистой оболочки ротовой полости и глотки, боль при глотании, кожная сыпь.

## Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Фузидин-натрий не сообщалось.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Фузидина натриевая соль вытесняет билирубин из связи с белками плазмы крови, тем самым увеличивает риск развития ядерной желтухи у новорожденных. Поэтому при необходимости назначения препарата Фузидин-натрий при беременности следует оценить предполагаемую пользу для матери и потенциальный риск для плода.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При сочетании Фузидина-натрия с другими антибактериальными препаратами отмечается усиление противомикробного действия.

## Особые указания и меры предосторожности:

Следует учитывать, что побочное действие со стороны пищеварительной системы обусловлено раздражающим действием препарата на слизистую оболочку ЖКТ. Поэтому рекомендуют принимать Фузидин-натрий после еды, с молоком или жидкой пищей.

При развитии аллергических реакций препарат следует отменить и назначить десенсибилизирующую терапию.

При тяжелом течении заболевания и необходимости длительного применения препарата рекомендуют сочетать Фузидин-натрий с полусинтетическими пенициллинами или тетрациклинами, что повышает эффективность терапии и предупреждает появление устойчивых микроорганизмов.

## Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре. Срок годности – 2 года.

*Условия отпуска из аптек*

## **Фузидин-Натрий**

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

---

Препарат отпускается по рецепту.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Fuzidin-Natriy>