Фузидин-Натрий



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

Таблетки, покрытые оболочкой	**1 таб.**
фузидина натриевая соль	125 мг
"-	250 мг

Вспомогательные вещества: ПВП, магния стеарат, сахар молочный, АФЦ, кислотный красный 2С, масло касторовое, титана диоксид.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
20 шт. - банки темного стекла (1) - пачки картонные.
20 шт. - банки полимерные (1) - пачки картонные.

Показания к применению:

—септицемия;

—пневмония;

—отит;

—абсцессы;

—флегмоны;

—фурункулез;

—инфицированные раны и ожоги;

—инфекции мягких тканей;

—остеомиелит;

—гонорея, вызванная штаммами, устойчивыми к бензилпенициллину, или при повышенной чувствительности пациента к бензилпенициллину.

Относится к болезням:

- Ожоги
- Раны

Противопоказания:

—повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают внутрь после приема пищи.

Для **взрослых** разовая доза составляет 500 мг, суточная доза – 1.5 г (в 3 приема с интервалами 8 ч).

При *тяжелых инфекциях* назначают в первые 1-2 дня 2-3 г/сут, затем дозу уменьшают до 1.5 г/сут. Продолжительность курса лечения – 7-14 дней, при *остеомиелите* – 2-3 недели.

Детям препарат назначают из расчета 40-60 мг/кг массы тела/сут, при *тяжелых инфекциях* - до 80 мг/кг/сут.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: боль в животе, тошнота, рвота, диарея.

Аллергические реакции: гиперемия слизистой оболочки ротовой полости и глотки, боль при глотании, кожная сыпь.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Фузидин-натрий не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Фузидина натриевая соль вытесняет билирубин из связи с белками плазмы крови, тем самым увеличивает риск развития ядерной желтухи у новорожденных. Поэтому при необходимости назначения препарата Фузидин-натрий при беременности следует оценить предполагаемую пользу для матери и потенциальный риск для плода.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При сочетании Фузидина-натрия с другими антибактериальными препаратами отмечается усиление противомикробного действия.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует учитывать, что побочное действие со стороны пищеварительной системы обусловлено раздражающим действием препарата на слизистую оболочку ЖКТ. Поэтому рекомендуют принимать Фузидин-натрий после еды, с молоком или жидкой пищей.

При развитии аллергических реакций препарат следует отменить и назначить десенсибилизирующую терапию.

При тяжелом течении заболевания и необходимости длительного применения препарата рекомендуют сочетать Фузидин-натрий с полусинтетическими пенициллинами или тетрациклинами, что повышает эффективность терапии и предупреждает появление устойчивых микроорганизмов.

Условия хранения:

Список Б. Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре. Срок годности – 2 года.

Условия отпуска из аптек

Препарат отпускается по рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Fuzidin-Natriy