

## Фузимет



### Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

**Мазь для наружного применения** от светло-желтого до желтого цвета.

	<b>100 г</b>
натриевая соль фузидовой кислоты	2 г
диоксометилтетрагидропиримидин	1 г

*Вспомогательные вещества:* натрия дисульфит, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский), ланолин безводный, вазелин, вода очищенная.

- 15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
- 25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
- 150 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
- 15 г - тубы полимерные (1) - пачки картонные.
- 25 г - тубы полимерные (1) - пачки картонные.
- 150 г - тубы полимерные (1) - пачки картонные.
- 0.5 кг - банки полимерные (1) - пачки картонные.
- 0.93 кг - банки полимерные (1) - пачки картонные.
- 2 кг - банки полимерные (1) - пачки картонные.
- 3 кг - банки полимерные (1) - пачки картонные.
- 0.5 кг - банки стеклянные (1) - пачки картонные.
- 0.93 кг - банки стеклянные (1) - пачки картонные.
- 2 кг - банки стеклянные (1) - пачки картонные.
- 3 кг - банки стеклянные (1) - пачки картонные.

### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Фузидат натрия (фузидин-натрия) - натриевая соль фузидовой (фузидиевой) кислоты, антибиотик, проявляющий высокую специфическую противомикробную активность в отношении *Staphylococcus* spp. (в т.ч. устойчивых к пенициллинам, стрептомицину, хлорамфениколу, эритромицину), *Neisseria meningitidis*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Haemophilus* spp., *Moraxella* spp. и *Corynebacterium* spp.

Обладает высокой антимикробной активностью в отношении *Staphylococcus epidermidis* (метициллин-резистентный и метициллин-чувствительный); меньшая - в отношении *Streptococcus* spp. (в т.ч. *Streptococcus pneumoniae*).

Неактивен в отношении *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Proteus* spp. и других грамотрицательных бактерий, а также простейших и грибов.

Диоксометилтетрагидропиримидин является стимулятором клеточной регенерации, обладает анаболической и антикатаболической активностью, сокращает сроки заживления ран.

**Фармакокинетика**

Фузидат натрия при наружном применении глубоко проникает в кожу в области пораженных участков.

Диоксометилтетрагидропиримидин при местном применении в виде мази практически не абсорбируется в системный кровоток.

**Показания к применению:**

Лечение гнойно-воспалительных заболеваний кожи, вызываемых чувствительными к фузидату натрия микроорганизмами:

- поверхностные фолликулиты;
- фурункулез;
- пиодермия;
- импетиго;
- гидраденит;
- глубокие раны и ссадины;
- сикоз;
- инфицированные раны и язвенные поверхности.

Лечение ожогов I-III-IV степени в качестве антимикробного и регенерирующего средства во второй фазе раневого процесса,

**Относится к болезням:**

- [Гидраденит](#)
- [Импетиго](#)
- [Раны](#)
- [Ссадины](#)
- [Фолликулит](#)
- [Фурункул](#)

**Противопоказания:**

- индивидуальная непереносимость компонентов мази;
- беременность, период грудного вскармливания;
- детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных);
- лейкоз (лейкемические формы, особенно миелоидные), лимфогранулематоз, гемобластозы, злокачественные заболевания костного мозга.

**Способ применения и дозы:**

Наружно. После удаления гноя и некротических масс мазь наносят тонким слоем 1-2 раза в день, при ожогах - 2-3 раза в неделю.

Продолжительность лечения зависит от формы и тяжести заболевания.

При обширных раневых процессах возможно сочетание мази с приемом фузидата натрия внутрь. В таких случаях доза фузидата натрия устанавливается врачом.

Средняя продолжительность курса терапии мазью 10-14 дней, возможно продление курса до 3-х недель.

**Побочное действие:**

*Редко (>0,01% и <0,1%):* аллергические реакции.

*Очень редко (<0,01%):* местно-раздражающее действие в виде покраснения и зуда, что обычно не требует отмены препарата.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

**Передозировка:**

За время пострегистрационного использования препарата случаев передозировки не отмечено.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Наблюдается усиление действия мази при сочетании применения мази и таблеток фузидата натрия.

Усиливается действие мази при сочетании с антибиотиками (полусинтетические пенициллины, тетрациклины, макролиды). Путь введения антибиотика не имеет определяющего значения.

**Условия хранения:**

При температуре не выше 15°C. Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:**

2 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** <http://drugs.thead.ru/Fuzimet>