Фузимет



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Мазь для наружного применения от светло-желтого до желтого цвета.

	100 г
натриевая соль фузидовой кислоты	2 г
диоксометилтетрагидропиримидин	1 г

Вспомогательные вещества: натрия дисульфит, повидон (поливинилпирролидон низкомолекулярный медицинский), ланолин безводный, вазелин, вода очищенная.

15 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
25 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
150 г - тубы алюминиевые (1) - пачки картонные.
15 г - тубы полимерные (1) - пачки картонные.
25 г - тубы полимерные (1) - пачки картонные.
150 г - тубы полимерные (1) - пачки картонные.
0.5 кг - банки полимерные (1) - пачки картонные.
0.93 кг - банки полимерные (1) - пачки картонные.
2 кг - банки полимерные (1) - пачки картонные.
3 кг - банки полимерные (1) - пачки картонные.
0.5 кг - банки стеклянные (1) - пачки картонные.
0.93 кг - банки стеклянные (1) - пачки картонные.
2 кг - банки стеклянные (1) - пачки картонные.
3 кг - банки стеклянные (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Фузидат натрия (фузидин-натрия) - натриевая соль фузидовой (фузидиевой) кислоты, антибиотик, проявляющий высокую специфическую противомикробную активность в отношении Staphylococcus spp. (в т.ч. устойчивых к пенициллинам, стрептомицину, хлорамфениколу, эритромицину), Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus spp., Moraxella spp. и Corynebacterium spp.

Обладает высокой антимикробной активностью в отношении Staphylococcus epidermidis (метициллин-резистентный и мттициллин-чувствительный); меньшая - в отношении Streptococcus spp. (в т.ч. Streptococcus pneumoniae).

Неактивен в отношении Escherichia coli, Salmonella spp., Proteus spp. и других грамотрицательных бактерий, а также простейших и грибов.

Диоксометилтетрагидропиримидин является стимулятором клеточной регенерации, обладает анаболической и антикатаболической активностью, сокращает сроки заживления ран.

Фармакокинетика

Фузидат натрия при наружном применении глубоко проникает в кожу в области пораженных участков.

Диоксометилтетрагидропиримидин при местном применении в виде мази практически не абсорбируется в системный кровоток.

Показания к применению:

Лечение гнойно-воспалительных заболеваний кожи, вызываемых чувствительными к фузидату натрия микроорганизмами:

— поверхностные фолликулиты;

— фурункулез;

— пиодермия;

— импетиго;

— гидраденит;

— глубокие раны и ссадины;

— сикоз;

— инфицированные раны и язвенные поверхности.

Лечение ожогов I-III-IV степени в качестве антимикробного и регенерирующего средства во второй фазе раневого процесса,

Относится к болезням:

- Гидраденит
- Импетиго
- Раны
- Ссадины
- Фолликулит
- Фурункул

Противопоказания:

— индивидуальная непереносимость компонентов мази;

— беременность, период грудного вскармливания;

— детский возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных);

— лейкоз (лейкемические формы, особенно миелоидные), лимфогранулематоз, гемобластозы, злокачественные заболевания костного мозга.

Способ применения и дозы:

Наружно. После удаления гноя и некротических масс мазь наносят тонким слоем 1-2 раза в день, при *ожогах* - 2-3 раза в неделю.

Продолжительность лечения зависит от формы и тяжести заболевания.

При обширных раневых процессах возможно сочетание мази с приемом фузидата натрия внутрь. В таких случаях доза фузидата натрия устанавливается врачом.

Средняя продолжительность курса терапии мазью 10-14 дней, возможно продление курса до 3-х недель.

Побочное действие:

Редко (>0,01% и <0,1%): аллергические реакции.

Очень редко (<0,01%): местно-раздражающее действие в виде покраснения и зуда, что обычно не требует отмены препарата.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка:

За время пострегистрационного использования препарата случаев передозировки не отмечено.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Наблюдается усиление действия мази при сочетании применения мази и таблеток фузидата натрия.

Усиливается действие мази при сочетании с антибиотиками (полусинтетические пенициллины, тетрациклины, макролиды). Путь введения антибиотика не имеет определяющего значения.

Условия хранения:

При температуре не выше 15°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Fuzimet