Галавит

Код АТХ:

- L03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Аминодигидрофталазиндион натрия

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН]
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Порошок для приготовления раствора для в/м введения кристаллический, белого или белого с желтоватым оттенком цвета.

	1 фл.
аминодигидрофталазиндион натрия дигидрат	50 мг
-"-	100 мг

Флаконы объемом 5 мл (3) - пачки картонные.
Флаконы объемом 5 мл (5) - пачки картонные.
Флаконы объемом 10 мл (3) - пачки картонные.
Флаконы объемом 10 мл (5) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Иммунотропные средства
- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Иммуномодулирующий препарат с противовоспалительным действием.

Механизм действия связан со способностью влиять на функционально-метаболическую активность макрофагов. При воспалительных заболеваниях обратимо (на 6-8 ч) ингибирует избыточный синтез фактора некроза опухолей, интерлейкина-1 и других провоспалительных цитокинов, активных форм кислорода гиперактивированными макрофагами, определяющими степень воспалительных реакций, их цикличность, а также выраженность интоксикации. Нормализация функционального состояния макрофагов приводит к восстановлению антигенпредставляющей и регулирующей функции макрофагов, снижению уровня аутоагрессии.

Препарат стимулирует бактерицидную активность нейтрофильных гранулоцитов, усиливая фагоцитоз и повышая неспецифическую резистентность организма к инфекционным заболеваниям.

Основные фармакологические эффекты наблюдаются в течение 72 ч.

Фармакокинетика

Выводится из организма, в основном, почками. После в/м введения $T_{1/2}$ составляет 30-40 мин.

Показания к применению:

В качестве иммуномодулятора и противовоспалительного средства в комплексной терапии иммунодефицитных состояний у **взрослых**:

— инфекционные кишечные заболевания, сопровождающиеся интоксикацией и/или диареей;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

— вирусные гепатиты;

— хронические рецидивирующие заболевания, вызванные вирусом герпеса;

— заболевания, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ);

— инфекционно-воспалительные заболевания урогенитального тракта (уретрит хламидийной и трихомонадной этиологии, хламидийный простатит, острый и хронический сальпингоофорит, хронический эндометрит);

— гнойно-воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ);

— послеоперационная реабилитация пациенток с миомой матки;

— осложнения послеоперационного периода у пациенток репродуктивного возраста;

— послеоперационные гнойно-септические осложнения и их профилактика (в т.ч. у онкологических пациентов);

— хронический рецидивирующий фурункулез, рожистое воспаление;

— астенические состояния, невротические и соматоформные расстройства, снижение физической работоспособности (в т.ч. у спортсменов);

— психические, поведенческие и постабстинентные расстройства при алкогольной и наркотической зависимости;

— воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта и горла, заболевания пародонта.

В качестве иммуномодулирующего и противоспалительного средства в комплексной терапии иммунодефицитных состояний у **детей в возрасте старше 6 лет**:

— гнойные хирургические заболевания (в т.ч. ожоговые поражения, рецидивирующий фурункулез, хронический остеомиелит, гангренозный аппендицит с оментитом, перитонит, гнойный плеврит);

— частые рецидивирующие заболевания дыхательных путей и ЛОР-органов бактериальной и вирусной этиологии (в т.ч. частые ОРВИ, бронхит, пневмония, хронический тонзиллит, хронический отит, хронический аденоидит).

Относится к болезням:

- Астенические состояния
- Астения
- Бронхит
- Воспаление

- Гепатит
- Гепатоз
- Герпес
- Диарея
- Интоксикация
- Инфекции
- Неврит
- Неврозы
- Остеомиелит
- Отит
- Папиллит
- Пародонтит
- Перитонит
- Плеврит
- Пневмония
- Простатит
- Сальпингит
- Сальпингоофорит
- Тонзиллит
- Уретрит
- Фурункул
- Эндометрит
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— беременность;

— лактация;

— индивидуальная непереносимость.

Способ применения и дозы:

Режим дозирования и продолжительность терапии устанавливают индивидуально в зависимости от характера, тяжести и длительности заболевания.

Для приготовления раствора для в/м инъекций препарат в форме порошка для приготовления раствора для инъекций разводят в 2 мл воды для инъекций или в 0.9% растворе натрия хлорида.

Взрослым

При *острых кишечных инфекциях, сопровождающихся диареей*, начальная разовая доза составляет 200 мг однократно. Затем препарат вводят в дозе 100 мг 2 раза/сут до купирования симптомов интоксикации. Возможно последующее продолжение курса по 100 мг с интервалом 72 ч. Курс составляет 20-25 инъекций.

При *язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в остром периоде* - 2 дня по 200 мг 1 раз/сут, затем - по 100 мг с интервалом 72 ч. Курс 15-25 инъекций. *В хроническом периоде* - в течение 5 дней по 100 мг 1 раз/сут, затем - по 100 мг через 72 ч. Курс - 20 инъекций.

При *вирусных гепатитах различной этиологии* в остром периоде заболевания начальная доза составляет 200 мг однократно, затем - по 100 мг 2 раза/сут до купирования симптомов интоксикации и воспаления. Последующее продолжение курса терапии в дозе 100 мг с интервалом 72 ч. Курс составляет 20-25 инъекций.

При *хронической рецидивирующей герпетической инфекции* препарат назначают по 100 мг ежедневно 5 инъекций, затем - по 100 мг через день 15 инъекций.

При *заболеваниях, вызванных ВПЧ,* препарат назначают в течение 5 дней по 100 мг 1 раз/сут, затем - по 100 мг через день. Курс составляет 20 инъекций.

При *урогенитальных инфекциях (хламидийном и трихомонадном уретрите, хламидийном простатите)* препарат назначают по 100 мг 2 раза/сут в течение 1 дня, затем переходят на введение препарата по 100 мг через день. Курс составляет 10-15 инъекций в зависимости от тяжести патологического процесса.

При *сальпингоофорите, эндометрите* в остром периоде препарат назначают в течение 2 дней по 200 мг 1 раз/сут, затем - по 100 мг с интервалом 72 ч. Курс - 20 инъекций. *В хроническом периоде* препарат назначают в течение 5 дней по 100 мг 1 раз/сут, затем - по 100 мг через каждые 72 ч. Курс составляет 20 инъекций.

При *острых и хронических ВЗОМТ в остром периоде* назначают препарат в течение 1 дня по 200 мг 1 раз/сут, далее в течение 3 дней по 100 мг ежедневно, затем - по 100 мг через день 5 инъекций. Курс - 20 инъекций. *В хроническом*

периоде назначают препарат в течение 5 дней по 100 мг 1 раз/сут, затем - по 100 мг через каждые 72 ч. Курс - 20 инъекций.

Для *послеоперационной реабилитации пациенток с миомой матки* и при *осложнениях послеоперационного периода у пациенток репродуктивного возраста* препарат назначают в течение 5 дней по 100 мг 1 раз/сут, затем - по 100 мг через день. Курс составляет 15 инъекций.

Для *профилактики и лечения хирургических осложнений* в дооперационном и послеоперационном периоде (в т.ч. у онкологических пациентов) препарат назначают по 100 мг 1 раз/сут. До операции 5 инъекций, после операции по 100 мг через день и 5 инъекций с интервалом 72 ч. При тяжелом течении заболевания начальная доза 200 мг 1 раз/сут или по 100 мг 2 раза/сут. Курс - 20 инъекций.

При *хроническом рецидивирующем фурункулезе, рожистом воспалении* назначают по 100 мг препарата 1 раз/сут в течение 5 дней, далее - по 100 мг через день. Курс - 20 инъекций.

При *астенических состояниях, невротических и соматоформных расстройствах, при психических, поведенческих и постабстинентных расстройствах, алкогольной и наркотической зависимости* препарат назначают в течение 5 дней по 100 мг 1 раз/сут, затем - по 100 мг через 72 ч. Курс составляет 15-20 инъекций.

Для *повышения физической работоспособности* препарат назначают по 100 мг через день 5 инъекций, затем - по 100 мг через 72 ч. Курс - до 20 инъекций.

При *воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта и глотки, заболеваниях пародонта* начальная доза 100 мг ежедневно 5 инъекций, затем - по 100 мг с интервалом 72 ч. Курс - 15 инъекций.

Детям в возрасте старше 6 лет

При *гнойных хирургических заболеваниях (в т.ч. ожоговых поражениях, рецидивирующем фурункулезе, хроническом остеомиелите, гангренозном аппендиците с оментитом, перитоните, гнойном плеврите)* препарат назначают **детям в возрасте от 6 до 11 лет** - по 1 инъекции 50 мг 1 раз/сут в течение 5 дней, затем по 1 инъекции 50 мг через день в течение 10-15 дней. Курс составляет 10-15 инъекций. **Детям в возрасте от 12 до 18 лет** лечение проводят по такой же схеме в виде в/м инъекций по 100 мг.

При перевязках желательно наружное применение Галавита в виде повязок со стерильными салфетками, смоченными 1% раствором Галавита в воде для инъекций (в повязки с болтушкой или водорастворимые мазевые повязки).

При *частых рецидивирующих заболеваниях дыхательных путей и ЛОР-органов бактериальной и вирусной этиологии (частых ОРВИ, бронхите, пневмонии, хроническом тонзиллите, хроническом отите, хроническом аденоидите)* **детям в возрасте от 6 до 11 лет** препарат назначают по 1 инъекции 50 мг 1 раз/сут в течение 5 дней, затем - по 50 мг 1 раз/сут через день в течение 10-15 дней. Курс составляет 10-15 инъекций. **Детям в возрасте от 12 до 18 лет** лечение проводят по такой же схеме в виде в/м инъекций по 100 мг.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Галавит не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не установлено клинически значимого взаимодействия препарата Галавит с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Особые указания по применению препарата отсутствуют.

Применение в детском возрасте

Препарат назначают детям старше 6 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре от 15° до 25°C.

Срок годности:

4 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: http://drugs.thead.ru/Galavit