Галавит (таблетки)



Код АТХ:

- L03

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Аминодигидрофталазиндион натрия

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Таблетки подъязычные белого цвета с желтоватым оттенком, двояковыпуклые, без риски, с запахом ментола.

	1 таб.
аминодигидрофталазиндион натрия	25 мг

Вспомогательные вещества: сорбитол, крахмал, лактоза, кальция стеарат, тальк, рацементол (ментол).

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
10 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (3) - пачки картонные.
20 шт. - упаковки ячейковые контурные (4) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Иммунотропные средства
- Ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспалительные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Иммуномодулирующий препарат с противовоспалительным действием.

Механизм действия связан со способностью влиять на функционально-метаболическую активность макрофагов. При воспалительных заболеваниях обратимо (на 6-8 ч) ингибирует избыточный синтез фактора некроза опухолей, интерлейкина-1 и других провоспалительных цитокинов, активных форм кислорода гиперактивированными макрофагами, определяющими степень воспалительных реакций, их цикличность, а также выраженность интоксикации. Нормализация функционального состояния макрофагов приводит к восстановлению антигенпредставляющей и регулирующей функции макрофагов, снижению уровня аутоагрессии.

Препарат стимулирует бактерицидную активность нейтрофильных гранулоцитов, усиливая фагоцитоз и повышая неспецифическую резистентность организма к инфекционным заболеваниям.

Основные фармакологические эффекты наблюдаются в течение 72 ч.

Фармакокинетика

Выводится из организма, в основном, почками. При подъязычном применении $T_{1/2}$ составляет 30 мин.

Показания к применению:

В качестве иммуномодулятора и противовоспалительного средства в комплексной терапии иммунодефицитных состояний у взрослых и подростков старше 12 лет:

— инфекционные кишечные заболевания, сопровождающиеся интоксикацией и/или диареей;

— язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

— вирусные гепатиты;

— хронические рецидивирующие заболевания, вызванные вирусом герпеса;

— заболевания, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ);

— инфекционно-воспалительные заболевания урогенитального тракта (уретрит хламидийной и трихомонадной этиологии, хламидийный простатит, острый и хронический сальпингоофорит, хронический эндометрит);

— гнойно-воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОМТ);

— послеоперационная реабилитация пациенток с миомой матки;

— осложнения послеоперационного периода у пациенток репродуктивного возраста;

— гнойные хирургические заболевания (ожоговые поражения, хронический остеомиелит, гангренозный аппендицит с оментитом, перитонит, гнойный плеврит);

— послеоперационные гнойно-септические осложнения и их профилактика (в т.ч. у онкологических пациентов);

— хронический рецидивирующий фурункулез, рожистое воспаление;

— астенические состояния, невротические и соматоформные расстройства, снижение физической работоспособности (в т.ч. у спортсменов);

— психические, поведенческие и постабстинентные расстройства при алкогольной и наркотической зависимости;

— воспалительные заболевания слизистой оболочки полости рта и горла, заболевания пародонта;

— частые рецидивирующие заболевания дыхательных путей и ЛОР-органов бактериальной и вирусной этиологии (в т.ч. частые ОРВИ, бронхит, пневмония, хронический тонзиллит, хронический отит, хронический аденоидит) и их профилактика.

Относится к болезням:

- Астенические состояния
- Астения
- Бронхит

- Воспаление
- Гепатит
- Гепатоз
- Герпес
- Интоксикация
- Инфекции
- Неврит
- Неврозы
- Остеомиелит
- Отит
- Папиллит
- Пародонтит
- Перитонит
- Плеврит
- Пневмония
- Простатит
- Сальпингит
- Сальпингоофорит
- Тонзиллит
- Уретрит
- Фурункул
- Эндометрит
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— беременность;

— лактация;

— индивидуальная непереносимость.

Способ применения и дозы:

Препарат принимают подъязычно по 1 таб. до 4 раз/сут или по 2 таб. до 2 раз/сут, в зависимости от диагноза и тяжести заболевания.

При *острых инфекционных кишечных заболеваниях, сопровождающихся диарейным синдромом,* начальная доза составляет 2 таб. однократно, затем - по 1 таб. 3-4 раза/сут до купирования симптомов интоксикации в течение 3-5 дней.

При *язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в остром периоде* в первые 2 суток следует принимать по 1 таб. 4 раза/сут, затем - через каждые 3 суток по 1 таб. 4 раза/сут, курс 2-3 недели. В *хроническом периоде* принимать в течение 5 суток по 1 таб. 4 раза/сут, затем - через каждые 3 суток по 1 таб. 4 раза/сут курсом до 3 недель.

При *вирусных гепатитах различной этиологии* в остром периоде заболевания начальная доза составляет по 2 таб. 2 раза/сут до купирования симптомов интоксикации и воспаления. Возможно последующее продолжение курса по 1 таб. 4 раза/сут через каждые 3 суток курсом до 2-3 недель.

При *хронических рецидивирующих заболеваниях, вызванных вирусом герпеса* - по 1 таб. 4 раза/сут в течение 10 дней. Затем - по 1 таб. 4 раза/сут через сутки в течение 10 дней.

При *заболеваниях, вызванных вирусом папилломы человека* следует принимать 5 дней по 1 таб. 4 раза/сут, затем - по 1 таб. 4 раза/сут через день курсом до 2-3 недель.

При *урогенитальных заболеваниях (уретрите хламидийной и трихомонадной этиологии, хламидийном простатите)* в первый день по 2 таб. 2 раза/сут, затем - по 1 таб. 4 раза/сут через день курсом до 2 недель (в зависимости от тяжести патологического процесса).

При *сальпингоофорите, эндометрите в острый период* по 2 таб. 2 раза/сут в течение 2 дней, затем - по 1 таб. 4 раза/сут через каждые 3 суток в течение 3 недель. В *хроническом периоде* – в течение 5 дней по 1 таб. 4 раза/сут, затем - по 1 таб. 4 раза/сут через каждые 3 суток курсом до 2-3 недель.

При *острых и хронических гнойных заболеваниях органов малого таза в остром периоде* в первый день по 2 таб. 2 раза/сут, затем - 3 дня по 1 таб. 4 раза/сут, затем - по 1 таб. 4 раза/сут через день в течение 10 дней. В *хроническом периоде* – в течение 5 дней по 1 таб. 4 раза/сут, затем - по 3-4 таб./сут через каждые 3 суток курсом до 3 недель.

Для *послеоперационной реабилитации больных с миомой матки и при осложнениях послеоперационного периода у женщин репродуктивного возраста* препарат следует принимать в течение 5 дней по 1 таб. 4 раза/сут, затем - по 1

таб. 4 раза/сут через день курсом до 2 недель.

При *гнойных хирургических заболеваниях (ожоговые поражения, хронический остеомиелит, гангренозный аппендицит с оментитом, перитонит, гнойный плеврит)* применять 4 раза/сут по 1 таб. в течение 5 дней, затем - по 1 таб. 4 раза через день курсом до 15 дней.

Для *профилактики и лечения хирургических осложнений в до- и послеоперационном периоде (в т.ч. у онкологических больных)* назначают по 1 таб. 4 раза/сут в течение 5 дней до операции, в течение 10 дней после операции по 1 таб. 4 раза через день и в течение 3 недель по 1 таб. 4 раза через 3 суток. При тяжелом течении заболевания - в первый день по 2 таб. 2 раза/сут.

При *хроническом рецидивирующем фурункулезе, роже* принимают 5 дней по 1 таб. 4 раза/сут, затем - по 1 таб. 4 раза через день курсом до 3 недель.

При *астенических состояниях, невротических и соматоформных расстройствах, при психических, поведенческих и постабстинентных расстройствах у пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью* - 5 дней по 1 таб. 4 раза/сут, затем - по 1 таб. 4 раза через каждые 3 суток в течение 3 недель.

Для *повышения физической работоспособности* - по 1 таб. 4 раза через день в течение 10 дней, затем - по 1 таб. 4 раза/сут через 3 суток курсом до 3 недель.

При *воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта и горла, заболеваниях пародонта* начальная доза 1 таб. 4 раза/сут в течение 5 дней, затем - по 1 таб. 4 раза/сут через 3 суток курсом до 3 недель.

При *частых рецидивирующих заболеваниях дыхательных путей и ЛОР-органов бактериальной и вирусной этиологии (частые ОРВИ, бронхит, пневмония, хронический тонзиллит, хронический отит, хронический аденоидит)* применять 4 раза/сут по 1 таб. в течение 5 дней, затем - по 1 таб. 4 раза через день курсом до 15 дней.

Для *профилактики острых респираторных инфекций и гриппа* - по 1 таб. 2 раза/сут. Курс 5-10 дней.

Побочное действие:

Редко: аллергические реакции.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки препарата Галавит не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат противопоказан при беременности и в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Случаи несовместимости с другими лекарственными препаратами не отмечены.

Особые указания и меры предосторожности:

При одновременном применении с препаратом Галавит возможно снижение курсовых доз антибиотиков.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Galavit_tabletki