Гальманин



Код АТХ:

- D08AX

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Салициловая кислота
- Цинка оксид

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] [МНН] Википедия[МНН] [МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Порошок для наружного применения*** белый или серовато-белый, жирный на ощупь.

	100 г
салициловая кислота	2 г
цинка оксид	10 г

Вспомогательные вещества: тальк 44 г, крахмал картофельный 44 г.

10 г - банки полимерные (1) - пачки картонные.
20 г - банки полимерные (1) - пачки картонные.
30 г - банки полимерные (1) - пачки картонные.
40 г - банки полимерные (1) - пачки картонные.
50 г - банки полимерные (1) - пачки картонные.
10 г - банки (1) из полиэтилентерефталата - пачки картонные.
20 г - банки (1) из полиэтилентерефталата - пачки картонные.
30 г - банки (1) из полиэтилентерефталата - пачки картонные.
40 г - банки (1) из полиэтилентерефталата - пачки картонные.
50 г - банки (1) из полиэтилентерефталата - пачки картонные.
25 г - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
2 г - пакеты термосвариваемые (5) - пачки картонные.
2 г - пакеты термосвариваемые (10) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения. Салициловая кислота оказывает противовоспалительное, антисептическое и кератолитическое действие. Цинка оксид оказывает подсушивающее действие.

Показания к применению:

— подострая экзема различного генеза;

— гипергидроз (потливость) стоп.

Относится к болезням:

- Экзема

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата,

— детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы:

Наружно. В виде присыпки тонким слоем порошок наносится на пораженные участки кожи и чистую (вымытую с мылом и вытертую насухо) кожу 1 раз в день.

Побочное действие:

Аллергические реакции, местные реакции - зуд, жжение.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период грудного вскармливания применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Перед началом применения обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами не изучалось.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Применение в детском возрасте

Противопоказано детям до 12 лет.

Условия хранения:

В сухом месте при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Galmanin