

Гальманин



Код АТХ:

- [D08AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Салициловая кислота](#)
- [Цинка оксид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [МНН](#) [Википедия](#)^{МНН} [МНН](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Порошок для наружного применения** белый или серовато-белый, жирный на ощупь.

| | |
|---------------------|--------------|
| | 100 г |
| салициловая кислота | 2 г |
| цинка оксид | 10 г |

Вспомогательные вещества: тальк 44 г, крахмал картофельный 44 г.

- 10 г - банки полимерные (1) - пачки картонные.
- 20 г - банки полимерные (1) - пачки картонные.
- 30 г - банки полимерные (1) - пачки картонные.
- 40 г - банки полимерные (1) - пачки картонные.
- 50 г - банки полимерные (1) - пачки картонные.
- 10 г - банки (1) из полиэтилентерефталата - пачки картонные.
- 20 г - банки (1) из полиэтилентерефталата - пачки картонные.
- 30 г - банки (1) из полиэтилентерефталата - пачки картонные.
- 40 г - банки (1) из полиэтилентерефталата - пачки картонные.
- 50 г - банки (1) из полиэтилентерефталата - пачки картонные.
- 25 г - банки оранжевого стекла (1) - пачки картонные.
- 2 г - пакеты термосвариваемые (5) - пачки картонные.
- 2 г - пакеты термосвариваемые (10) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для наружного применения. Салициловая кислота оказывает противовоспалительное, антисептическое и кератолитическое действие. Цинка оксид оказывает подсушивающее действие.

Показания к применению:

- подострая экзема различного генеза;
- гипергидроз (потливость) стоп.

Относится к болезням:

- [Экзема](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата,
- детский возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы:

Наружно. В виде присыпки тонким слоем порошок наносится на пораженные участки кожи и чистую (вымытую с мылом и вытертую насухо) кожу 1 раз в день.

Побочное действие:

Аллергические реакции, местные реакции - зуд, жжение.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период грудного вскармливания применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Перед началом применения обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами не изучалось.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Применение в детском возрасте

Гальманин

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Противопоказано детям до 12 лет.

Условия хранения:

В сухом месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Galmanin>