

Галстена



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Капли гомеопатические** в виде прозрачного желтоватого раствора со слабым специфическим запахом.

	100 мл
расторопша пятнистая (Carduus) D1	2 мл
одуванчик лекарственный (Taraxacum) D6	10 мл
чистотел большой (Chelidonium) D6	10 мл
натрия сульфат (Natrium sulfuricum) D12	10 мл
фосфор (Phosphorus) D12	10 мл

Вспомогательные вещества: этанол 43% по массе.

20 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с капельным дозатором - пачки картонные.

50 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с капельным дозатором - пачки картонные.

100 мл - флаконы темного стекла (1) в комплекте с капельным дозатором - пачки картонные.

♦ **Таблетки подъязычные гомеопатические** круглые, плоскоцилиндрические, с риской и фаской, белого цвета с вкраплениями и мраморностью, без запаха.

	1 таб.
расторопша пятнистая (Carduus) D1	7.4 мг
одуванчик лекарственный (Taraxacum) D6	37.2 мг
чистотел большой (Chelidonium) D6	37.2 мг
натрия сульфат (Natrium sulfuricum) D12	37.2 мг
фосфор (Phosphorus) D12	37.2 мг

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат.

12 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

12 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

12 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

12 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комплексный гомеопатический препарат. Оказывает гепатопротекторное действие, проявляющееся в уменьшении выраженности синдрома цитолиза и внутрипеченочного холестаза, нормализует моторную и эвакуаторную функцию желчевыводящих путей, устраняет симптомы диспепсии. Галстена оказывает желчегонное, спазмолитическое, противовоспалительное действие, предупреждает образование камней желчного пузыря.

Фармакокинетика

Действие препарата Галстена является результатом совокупного действия его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Показания к применению:

В составе комплексной терапии при:

- острых и хронических заболеваниях печени (гепатит, гепатоз);
- заболеваниях желчного пузыря (хронический холецистит, постхолецистэктомический синдром);
- хроническом панкреатите.

Относится к болезням:

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Постхолецистэктомический синдром](#)
- [Холера](#)
- [Холецистит](#)

Противопоказания:

- алкогольная зависимость;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

При *остром и хроническом гепатите, гепатозе, хроническом панкреатите* **детям в возрасте до 1 года** назначают по 1/2 таб. или 1 капле, **детям 1-12 лет** - 1/2 таб. или 5 капель, **взрослым и подросткам** - 1 таб. или 10 капель. Кратность приема - 3 раза/сут. Длительность лечения - не менее 3 мес. При необходимости курс лечения можно повторить через 1 мес.

При *хроническом холецистите, желчнокаменной болезни, постхолецистэктомическом синдроме* **детям в возрасте до 12 лет** назначают 1/2 таб. или 5 капель, **взрослым и подросткам** - 1 таб. или 10 капель. Кратность приема - 3 раза/сут. Длительность лечения - 3 мес. При необходимости курс лечения можно повторить через 1 мес.

В *начале заболевания, а также в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов*, возможно назначение препарата каждые 0.5-1 ч **детям до 1 года** - по 1 капле, **детям 1-12 лет** - по 5 капель, **взрослым и детям старше 12 лет** - по 8-10 капель, но не более 8 раз/сут. После улучшения состояния препарат назначают 3 раза/сут.

Препарат принимают за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи (детям до 1 года - до или через 1 ч после кормления). Капли принимают в чистом виде или разводят в 1 столовой ложке воды. Детям до 1 года капли разводят в 1 чайной ложке воды или материнского молока. 1/2 таб. также следует растворить в 1 чайной ложке воды или материнского молока и давать по 1 капле. Перед проглатыванием рекомендуется задержать препарат во рту на 20-30 сек. Таблетку следует держать под языком до полного рассасывания.

Побочное действие:

Редко: повышенное слюноотделение.

Пациент должен быть информирован о том, что при возникновении других побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка:

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Вопрос о применении препарата Галстена при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) решается врачом индивидуально.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Клинически значимое взаимодействие препарата Галстена с другими лекарственными средствами не установлено.

Особые указания и меры предосторожности:

Поскольку препарат Галстена в форме капель гомеопатических содержит растительные природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное помутнение раствора или ослабление запаха и вкуса, что не приводит к снижению эффективности препарата.

При нарушениях функции печени

Возможно применение препарата по показаниям

Применение в детском возрасте

Возможно применение препарата у детей (см. Режим дозирования).

Условия хранения:

Препарат в форме таблеток подъязычных следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света, недоступном для детей месте. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Препарат в форме капель гомеопатических следует хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и сильных электромагнитных полей месте, недоступном для детей. Срок годности - 5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Galstena>