

[Гаммалон](#)



Код АТХ:

- [N03AG03](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Гамма-аминомасляная кислота](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Таблетки 250 мг в коробке 10/100 блистеров по 10 шт.

Состав:

Одна таблетка содержит

Активное вещество: гамма-аминомасляная кислота 250 мг.

Описание:

Таблетки круглые, блестящие, покрытые оболочкой от белого до светло-желтого цвета.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Нейротропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Стимулирующее метаболизм в ЦНС, ноотропное. Улучшает кровоснабжение головного мозга, активирует энергетические процессы, повышает дыхательную активность тканей, улучшает утилизацию глюкозы и удаление токсических продуктов обмена. Улучшает динамику нервных процессов в головном мозге, повышает продуктивность мышления, улучшает память, оказывает умеренное психостимулирующее, антигипоксическое и противосудорожное действие. Способствует восстановлению речевых и двигательных функций после нарушения мозгового кровообращения. Оказывает умеренное гипотензивное действие, уменьшает исходно повышенное АД и выраженность обусловленных гипертонией симптомов (головокружение, бессонница), незначительно урежает частоту сердечных сокращений. У больных сахарным диабетом снижает уровень глюкозы в крови, при нормальной гликемии нередко вызывает гипергликемию, обусловленную гликогенолизом.

Фармакокинетика

Концентрация в плазме достигается максимум через 60 мин, затем быстро снижается; через 24 ч в плазме крови не определяется. Малотоксичен.

Показания к применению:

Препарат рекомендован к применению при следующих состояниях:

- поражение сосудов головного мозга (атеросклероз, гипертоническая болезнь и др.);
- цереброваскулярная недостаточность и дисциркуляторная энцефалопатия;
- нарушение памяти, внимания, речи, головокружение, головная боль;
- последствия инсульта и черепно-мозговой травмы;
- алкогольная энцефалопатия, алкогольный полиневрит;
- умственная отсталость у детей, слабоумие, детский церебральный паралич;
- эндогенная депрессия с преобладанием астеноипохондрических явлений и затруднением умственной деятельности;
- симптомокомплекс качивания (морская, дорожная и воздушная болезни).

Относится к болезням:

- [Алкогольная энцефалопатия](#)
- [Алкогольный полиневрит](#)
- [Атеросклероз](#)
- [Воздушная болезнь](#)
- [Гипертония](#)
- [Головная боль](#)
- [Головокружение](#)
- [Депрессивное расстройство](#)
- [Детский церебральный паралич](#)
- [Дисциркуляторная энцефалопатия](#)
- [Дорожная болезнь](#)
- [Инсульт](#)
- [Морская болезнь](#)
- [Нарушение внимания](#)
- [Нарушение памяти](#)
- [Нарушение речи](#)
- [Слабоумие](#)
- [Умственная отсталость](#)
- [Цереброваскулярная недостаточность](#)
- [Черепно-мозговая травма](#)

Противопоказания:

Препарат не должен применяться при наличии какого-либо из состояний, перечисленных ниже:

- гиперчувствительность;
- детский возраст (до 1 года);
- острая почечная недостаточность;

— беременность (I триместр).

Способ применения и дозы:

Внутрь, до еды.

Суточная доза:

— для взрослых - 3-3.75 г;

— для детей 1-3 лет - 1-2 г/сут, 4-6 лет - 2-3 г/сут, старше 7 лет - 3 г/сут.

Суточную дозу делят на 3 приема. Лечение проводится длительно (от 2-3 нед до 2-4 мес). С целью профилактики и лечения синдрома укачивания взрослым - 0.5 г, детям - 0.25 г 3 раза в день в течение 3-4 сут.

Побочное действие:

Повышение температуры тела, тошнота, бессонница, возможны колебания АД (в первые дни приема).

Передозировка:

Случаев передозировки препарата при клиническом применении не зарегистрировано.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность применения препарата Гаммалон во время беременности и в период лактации не установлена. Применение препарата противопоказано во время беременности (I триместр).

Во время грудного вскармливания не рекомендуется прием препарата, т.к. отсутствуют данные о проникновении препарата в грудное молоко.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие бензодиазепинов, многих снотворных и противоэпилептических лекарственных средств, улучшающих функции ЦНС. Бензодиазепины потенцируют действие.

Особые указания и меры предосторожности:

В первые дни лечения возможны колебания АД.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

По рецепту.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Gammalon>
