

Гастал Ликво



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр](#) [Википедия](#)

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

◇ **Суспензия для приема внутрь** белого цвета, с характерным запахом; допускается оседание частиц суспензии при хранении.

	5 мл
алгелдрат (алюминия гидроксида гель)	2.528 г,
что соответствует содержанию алюминия гидроксида	0.388 мг
магния гидроксида паста	0.833 мг,
что соответствует содержанию магния гидроксида	0.258 мг

Вспомогательные вещества: глицерол 85% - 0.5 г, сорбитол 70% - 0.5 г, натрия бензоат - 0.0225 г, бензойная кислота - 0.0025 г, масло коричника цейлонского - 0.00125 г, этанол 96% - 0.4 г, вода очищенная - до 5 мл.

5 мл - саше из многослойного материала (12) - пачки картонные.

5 мл - саше из многослойного материала (30) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированное средство, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами: оказывает антацидное, адсорбирующее, обволакивающее, ветрогонное и желчегонное действие. Послабляющее действие магния гидроксида уравнивает эффект альгелдрата, оказывающего обратное влияние на моторику кишечника. Нейтрализует свободную соляную кислоту в желудке, понижает активность желудочного сока. Время нахождения в желудке - около 1 ч.

Фармакокинетика

Абсорбция - низкая.

Показания к применению:

Острый гастрит; гиперацидный гастрит; острый дуоденит; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в фазе обострения); симптоматические язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной кишки различного генеза; эрозии слизистой оболочки верхних отделов ЖКТ; рефлюкс-эзофагит; грыжа пищеводного отверстия диафрагмы; острый панкреатит; обострение хронического панкреатита; гиперфосфатемия; дискомфорт, гастралгия, изжога (после избыточного употребления этанола, никотина, кофе, приема лекарственных средств, погрешностей в

диете); бродильная или гнилостная диспепсия (в составе комбинированной терапии).

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Грыжа](#)
- [Диспепсия](#)
- [Дуоденит](#)
- [Изжога](#)
- [Панкреатит](#)
- [Рефлюкс-эзофагит](#)
- [Эзофагит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к альгельдрату и магнезия гидроксиду; ХПН; беременность; болезнь Альцгеймера; гипофосфатемия.

С осторожностью: детский возраст до 12 лет, период лактации (грудного вскармливания).

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 5-10 мл (суспензии, геля) или 2-3 таб. через 1-2 ч после еды и на ночь, при *язвенной болезни желудка* - за 30 мин до приема пищи; при необходимости разовую дозу увеличивают до 15 мл или 3-4 таб. После достижения терапевтического эффекта - поддерживающая терапия по 5 мл или 1 таб. 3 раза/сут. в течение 2-3 мес.

Детям от 4 до 12 мес - 7.5 мл, **детям старше 1 года** - 15 мл 3 раза/сут.

Для профилактики принимают по 5-10 мл или 1-2 таб. перед возможным раздражающим воздействием на слизистую оболочку ЖКТ.

Для повышения эффективности таблетки следует разжевать или держать во рту до полного растворения. Суспензию или гель перед приемом необходимо гомогенизировать, встряхивая флакон или тщательно разминая пакет между пальцами. Содержимое пакета выдавливают в ложку или в рот.

Побочное действие:

Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, изменение вкусовых ощущений, запоры.

При длительном приеме в высоких дозах: гипофосфатемия, гипокальциемия, гиперкальциурия, остеомалация, остеопороз, гипермагниемия, гипералюминиемия, энцефалопатия, нефрокальциноз, нарушение функции почек.

У пациентов с сопутствующей почечной недостаточностью - жажда, снижение АД, гипорефлексия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности противопоказано.

С осторожностью применять в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Снижает и замедляет абсорбцию дигоксина, индометацина, салицилатов, хлорпромазина, фенитоина, блокаторов H₂-гистаминовых рецепторов, бета-адреноблокаторов, дифлунизала, кетоназола и итраконазола, изониазида, антибиотиков тетрациклинового ряда и хинолонов (ципрофлоксацина, норфлоксацина, офлоксацина, эноксацина, грепофлоксацина и др.), азитромицина, цефподоксима, пивампициллина, рифампицина, непрямых антикоагулянтов, барбитуратов (их следует применять за 1 ч до или через 2 ч после приема антацидов), фексофенадина, дипиридамола, залцитабина, хенодесоксихолевой и урсодесоксихолевой кислот, пенициллина и лансопрозола.

Блокаторы м-холинорецепторов, замедляя опорожнение желудка, усиливают и удлиняют действие препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

При длительном назначении следует обеспечить достаточное поступление с пищей солей фосфора.

Для адекватного подбора разовой дозы целесообразно проведение острой фармакологической пробы (после введения суспензии через желудочный зонд и последующего промывания его 10 мл воды, проводят оценку pH желудочного сока через 1 ч; если pH ниже 3.5, необходимо увеличение дозы).

Источник: http://drugs.thead.ru/Gastal_Likvo