

## Гастенорм форте



### **Код АТХ:**

- [A09AA02](#)

### **Международное непатентованное название (Действующее вещество):**

- [Панкреатин](#)

### **Полезные ссылки:**

[Цена в Яндексе](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)

[Госреестр<sup>МНН</sup>](#) [Википедия<sup>МНН</sup>](#)

[РЛС VITAL](#) [Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>](#)

### **Форма выпуска:**

◊ **Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой** белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые; допустима слегка шероховатая поверхность.

<b>1 таб.</b>	
панкреатин	140 мг
с минимальной ферментативной активностью:	
липазы	3 500 ЕД FIP
амилазы	4 200 ЕД FIP
протеаз	250 ЕД FIP

*Вспомогательные вещества:* повидон К-30, натрия хлорид, целлюлоза микрокристаллическая, лактозы моногидрат, натрия гликолат, кремния диоксид коллоидный, тальк, магния стеарат, опадрай белый OY-IN-58903 (целлацефат, триацетин, титана диоксид, сорбитана олеат).

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

### **Гастенорм форте 10 000**

◊ **Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой** белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые; допустима слегка шероховатая поверхность.

<b>1 таб.</b>	
панкреатин	225 мг
с минимальной ферментативной активностью:	
липазы	10 000 ЕД FIP
амилазы	7 500 ЕД FIP
протеаз	375 ЕД FIP

*Вспомогательные вещества:* повидон К-30, натрия хлорид, целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон, натрия лаурилсульфат, кремния диоксид коллоидный, тальк, магния стеарат, опадрай белый OY-IN-58903 (целлацефат, триацетин, титана диоксид, сорбитана олеат).

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

**Фармакотерапевтическая группа:**

- [Метаболики](#)

**Фармакологические свойства:****Фармакодинамика**

Препарат компенсирует недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы.

Входящие в состав панкреатина ферменты липаза, амилаза и протеаза облегчают переваривание жиров, углеводов и белков, что способствует их более полному всасыванию в тонком кишечнике.

**Фармакокинетика**

Данные о фармакокинетике не предоставлены.

**Показания к применению:**

- недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы (хронический панкреатит, муковисцидоз);
- хронические воспалительно-дистрофические заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря. Состояния после резекции или облучения этих органов, сопровождающиеся нарушением переваривания пищи, метеоризмом, диареей (в составе комбинированной терапии);
- для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей в питании, а также при нарушениях жевательной функции, вынужденной длительной иммобилизации, малоподвижном образе жизни;
- подготовка к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию органов брюшной полости.

**Относится к болезням:**

- [Диарея](#)
- [Метеоризм](#)
- [Муковисцидоз](#)
- [Панкреатит](#)

**Противопоказания:**

- острый панкреатит;
- обострение хронического панкреатита;
- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

**Способ применения и дозы:**

Доза определяется индивидуально в зависимости от степени нарушения пищеварения.

Продолжительность лечения может варьировать от однократного приема или нескольких дней (при нарушении процесса пищеварения вследствие погрешностей в диете) до нескольких месяцев или лет (при необходимости постоянной заместительной терапии).

**Гастенорм форте**

**Взрослым** (при отсутствии других предписаний): по 1-4 таб. во время еды, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости. Не рекомендуется превышать суточную дозу ферментов, составляющую 15 000 ЕД FIP липазы на кг массы тела.

У **детей** препарат применяется по назначению врача. Обычно назначается по 1 таб. 3 раза/сут во время приема пищи.

**Гастенорм форте 10 000**

**Взрослым** (при отсутствии других предписаний): по 1-2 таб. во время еды, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости.

У **детей** препарат применяется по назначению врача.

**Побочное действие:**

Аллергические реакции: чиханье, слезотечение, кожная сыпь.

Редко: диарея или запор, тошнота, дискомфорт в эпигастральной области.

При длительном применении в высоких дозах возможно развитие гиперурикозурии, повышение уровня мочевой кислоты в плазме крови.

При муковисцидозе в случае превышения необходимой дозы возможно развитие структур (фиброзной колонопатии) в илеоцекальном отделе и в восходящей ободочной кишке.

При применении панкреатина в высоких дозах у детей возможно возникновение перианального раздражения и раздражения слизистой оболочки полости рта.

**Передозировка:**

Симптомы: гиперурикозурия, гиперурикемия; у детей - запор.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

**Применение при беременности и кормлении грудью:**

Безопасность применения панкреатина при беременности изучена недостаточно. Применение возможно в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

В период лактации применение панкреатина не противопоказано.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

При одновременном применении панкреатина с препаратами железа возможно снижение всасывания последних.

Одновременное применение антацидных средств, содержащих кальция карбонат и/или магния гидроксид, может привести к снижению эффективности панкреатина.

**Особые указания и меры предосторожности:**

При длительном применении одновременно назначают препараты железа.

**Применение в детском возрасте**

Противопоказано: детский возраст до 3 лет.

У **детей** препарат применяется по назначению врача. Обычно назначается по 1 таб. 3 раза/сут во время приема пищи.

**Условия хранения:**

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

**Срок годности:**

3 года.

**Условия отпуска в аптеке:**

Без рецепта.

**Источник:** [http://drugs.thead.ru/Gastenorm\\_Forte](http://drugs.thead.ru/Gastenorm_Forte)