Гастенорм Форте 10 000



Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой*** белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые; допустима слегка шероховатая поверхность.

	1 таб.
панкреатин	140 мг
с минимальной ферментативной активностью:	
липазы	3 500 ЕД FIP
амилазы	4 200 ЕД FIP
протеаз	250 ЕД FIP

Вспомогательные вещества: повидон K-30, натрия хлорид, целлюлоза микрокристаллическая, лактозы моногидрат, натрия гликолат, кремния диоксид коллоидный, тальк, магния стеарат, опадрай белый OY-IN-58903 (целлацефат, триацетин, титана диоксид, сорбитана олеат).

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.
10 шт. - блистеры (5) - пачки картонные.

Гастенорм форте 10 000

◊ ***Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой*** белого или почти белого цвета, круглые, двояковыпуклые, допустима слегка шероховатая поверхность.

	1 таб.
панкреатин	225 мг
с минимальной ферментативной активностью:	
липазы	10 000 ЕД FIP
амилазы	7 500 ЕД FIP
протеаз	375 ЕД FIP

Вспомогательные вещества: повидон K-30, натрия хлорид, целлюлоза микрокристаллическая, кросповидон, натрия лаурилсульфат, кремния диоксид коллоидный, тальк, магния стеарат, опадрай белый OY-IN-58903 (целлацефат, триацетин, титана диоксид, сорбитана олеат).

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат компенсирует недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы.

Входящие в состав панкреатина ферменты липаза, амилаза и протеаза облегчают переваривание жиров, углеводов и белков, что способствует их более полному всасыванию в тонком кишечнике.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике не предоставлены.

Показания к применению:

— недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы (хронический панкреатит, муковисцидоз);

— хронические воспалительно-дистрофические заболевания желудка, кишечника, печени, желчного пузыря. Состояния после резекции или облучения этих органов, сопровождающиеся нарушением переваривания пищи, метеоризмом, диареей (в составе комбинированной терапии);

— для улучшения переваривания пищи у пациентов с нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей в питании, а также при нарушениях жевательной функции, вынужденной длительной иммобилизации, малоподвижном образе жизни;

— подготовка к рентгенологическому и ультразвуковому исследованию органов брюшной полости.

Относится к болезням:

- Диарея
- Метеоризм
- Муковисцидоз
- Панкреатит

Противопоказания:

— острый панкреатит;

— обострение хронического панкреатита;

— детский возраст до 3 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Доза определяется индивидуально в зависимости от степени нарушения пищеварения.

Продолжительность лечения может варьировать от однократного приема или нескольких дней (при нарушении процесса пищеварения вследствие погрешностей в диете) до нескольких месяцев или лет (при необходимости постоянной заместительной терапии).

Гастенорм форте

Взрослым (при отсутствии других предписаний): по 1-4 таб. во время еды, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости. Не рекомендуется превышать суточную дозу ферментов, составляющую 15 000 ЕД FIP липазы на кг массы тела.

У **детей** препарат применяется по назначению врача. Обычно назначается по 1 таб. 3 раза/сут во время приема пищи.

Гастенорм форте 10 000

Взрослым (при отсутствии других предписаний): по 1-2 таб. во время еды, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости.

У **детей** препарат применяется по назначению врача.

Побочное действие:

Аллергические реакции: чиханье, слезотечение, кожная сыпь.

Редко: диарея или запор, тошнота, дискомфорт в эпигастральной области.

При *длительном применении в высоких дозах* возможно развитие гиперурикозурии, повышение уровня мочевой кислоты в плазме крови.

При *муковисцидозе в случае превышения необходимой дозы* возможно развитие стриктур (фиброзной колонопатии) в илеоцекальном отделе и в восходящей ободочной кишке.

При *применении панкреатина в высоких дозах у детей* возможно возникновение перианального раздражения и раздражения слизистой оболочки полости рта.

Передозировка:

Симптомы: гиперурикозурия, гиперурикемия; у детей - запор.

Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Безопасность применения панкреатина при беременности изучена недостаточно. Применение возможно в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

В период лактации применение панкреатина не противопоказано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

При одновременном применении панкреатина с препаратами железа возможно снижение всасывания последних.

Одновременное применение антацидных средств, содержащих кальция карбонат и/или магния гидроксид, может привести к снижению эффективности панкреатина.

Особые указания и меры предосторожности:

При длительном применении одновременно назначают препараты железа.

Применение в детском возрасте

Противопоказано: детский возраст до 3 лет.

У **детей** препарат применяется по назначению врача. Обычно назначается по 1 таб. 3 раза/сут во время приема пищи.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gastenorm_Forte_10_000