

Гастрацид



Код АТХ:

- [A02AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Алгелдрат](#)
- [Магния гидроксид](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#)^{МНН МНН} [Википедия](#)^{МНН МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ Таблетки для рассасывания	1 таб.
алгелдрат (алюминия гидроксид)	400 мг
магния гидроксид	400 мг

6 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

6 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

10 шт. - блистеры (2) - пачки картонные.

10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат для устранения изжоги и боли в желудке, действие которого обусловлено входящими в

его состав компонентами.

Алгелдрат оказывает антацидное, адсорбирующее, обволакивающее, ветрогонное действие. Магния гидроксид оказывает легкое послабляющее действие. Препарат нейтрализует свободную соляную кислоту в желудке, снижает активность желудочного сока; инактивирует пепсин и связывает желчные кислоты, попадающие в желудок в результате рефлюкса из 12-перстной кишки, оказывает защитное действие на слизистую оболочку желудка и 12-перстной кишки; ускоряет моторику желудка и всех отделов кишечника. Не вызывает вторичную гиперсекрецию соляной кислоты и алкалоз.

Фармакокинетика

Абсорбция - низкая.

Показания к применению:

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
- острый гастрит с повышенной и нормальной секреторной функцией в фазе обострения, острый дуоденит;
- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофагит;
- дискомфорт, изжога и боли в эпигастрии при погрешности в диете, после приема лекарств, в том числе глюкокортикостероидов и нестероидных противовоспалительных препаратов, а также после употребления кофе, никотина, алкоголя.

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Грыжа](#)
- [Дуоденит](#)
- [Изжога](#)
- [Рефлюкс-эзофагит](#)
- [Эзофагит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Дефицит сахаразы / изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Гипофосфатемия, выраженное нарушение функции почек, детский возраст до 10 лет, болезнь Альцгеймера, беременность.

С осторожностью: в период лактации.

Способ применения и дозы:

Внутрь. Таблетки следует разжевывать и держать во рту до полного рассасывания.

Взрослым и детям старше 15 лет по 1-2 таблетки 4 раза в сут. через 1 ч после еды и вечером перед сном или при возникновении дискомфорта, болей в эпигастрии, изжоги.

При язвенной болезни желудка препарат необходимо принять за 30 мин до приема пищи. Максимальная суточная доза - 12 таблеток.

Детям от 10 до 15 лет назначают половину рекомендованной дозы для взрослых.

Для профилактики - по 1 таблетке за 15 мин до приема лекарств, раздражающих слизистую оболочку пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Продолжительность лечения не должна превышать 15-20 дней.

Побочное действие:

Запор, тошнота, рвота, боли в желудке спастического характера, изменение вкусовых ощущений, гипермагниемия, гипофосфатемия, гипокальциемия, гиперкальциурия, остеомаляция, остеопороз, гипералюминиемия, энцефалопатия, нефрокальциноз, нарушение функции почек, аллергические реакции. У больных с сопутствующей

почечной недостаточностью - жажда, снижение артериального давления, гипорефлексия.

Передозировка:

Симптомы: Образование камней в почках, появление тяжелых запоров, сонливость, гипермагниемия. Могут наблюдаться также признаки метаболического алкалоза: изменение настроения, онемение или боль в мышцах, нервозность и быстрая утомляемость, неприятные вкусовые ощущения.

Лечение: Необходимо сразу предпринять меры по быстрому выведению препарата: промыть желудок, вызвать рвоту, принять активированный уголь.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Противопоказан во время беременности. Применять с осторожностью в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Может адсорбировать некоторые лекарственные средства, уменьшая, таким образом, их всасывание. Снижает и замедляет абсорбцию дигоксина, индометацина, салицилатов, хлорпромазина, фенитоина, блокаторов H₂-гистаминовых рецепторов, бета-адреноблокаторов, дифлунисала, изониазида, антибиотиков тетрациклинового ряда, хинолонов (ципрофлоксацина, норфлоксацина, офлоксацина, эноксацина, грепафлоксацина и др.), азитромицина, цефподоксима, пивампициллина, рифампицина, непрямых антикоагулянтов, барбитуратов, фексофенадина, дипиридамола, залцитабина, желчных кислот - хенодезоксихолевой и урсодезоксихолевой, пенициллина, препаратов железа и лития, хинидина, лансопризола, мексилетина, кетоконазола. При одновременном приеме с препаратами, покрытыми кишечнорастворимой оболочкой, повышенная щелочность желудочного сока может привести к ускоренному нарушению оболочки и вызвать раздражение желудка и двенадцатиперстной кишки. М-холиноблокаторы, замедляя опорожнение желудка, усиливают и удлиняют действие препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

Интервал между приемом препарата Гастрацид и других лекарственных средств должен составлять 1-2 ч.

При более длительном применении (более 20 дней) необходим регулярный врачебный контроль. Препарат содержит сорбитол, который противопоказан при врожденной непереносимости фруктозы.

Препарат не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и занятием другими видами деятельности, требующими концентрации внимания и скорости психомоторных реакций.

При нарушениях функции почек

Противопоказан при выраженных нарушениях функции почек.

Применение в детском возрасте

Противопоказан в детском возрасте до 10 лет.

Условия хранения:

Препарат хранить при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте!

Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Гастрацид

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Gastracid>