Гастрикумель

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички
Госреестр Википедия
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Таблетки подъязычные гомеопатические*** от белого до желтовато-белого цвета, иногда с желтоватыми или сероватыми вкраплениями, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской, без запаха.

	1 таб.
Argentum nitricum (аргентум нитрикум) D6	30 мг
Acidum arsenicosum (Arsenicum album) (ацидум арсеникозум (арсеникум альбум)) D6	30 мг
Pulsatilla pratensis (Pulsatilla) (пульсатилла пратенсис (пульсатилла)) D4	60 мг
Strychnos nux-vomica (Nux vomica) (стрихнос нукс-вомика (нукс вомика)) D4	60 мг
Carbo vegetabilis (карбо вегетабилис) D6	60 мг
Stibium sulfuratum nigrum (стибиум сульфуратум нигрум) D6	60 мг

Вспомогательные вещества: магния стеарат, лактоза.

50 шт. - пеналы полипропиленовые (1) - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Гомеопатическое средство.

Показания к применению:

— воспалительные заболевания слизистой оболочки желудка (гастрит);

— диспепсические расстройства ЖКТ (изжога, метеоризм).

Относится к болезням:

- Диспепсия
- Изжога
- Метеоризм

Противопоказания:

— детский возраст до 3-х лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более 2 часов (но не более 12 таблеток в день).

Курс лечения — 2-3 недели. При необходимости курс лечения можно повторить после консультации с врачом.

Применение препарата у детей от 3-х лет возможно по назначению и под контролем врача.

Побочное действие:

Возможны аллергические реакции.

Применение при беременности и кормлении грудью:

В период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после предварительной консультации с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.

Особые указания и меры предосторожности:

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.

В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.

Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0.025 ХЕ.

Применение в детском возрасте

Применение препарата у детей от 3-х лет возможно по назначению и под контролем врача.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°C до 25°C. Хранить в недоступном для детей месте! Не применять по истечении срока годности.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gastrikumel