

Гастрофарм



Код АТХ:

- [A02BX](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

♦ **Таблетки** круглые, плоские, с ровными краями, бежево-коричневого цвета, допускается наличие вкраплений и неоднородности цвета в виде "мраморности", с разделительной риской на одной из сторон; диаметр 25 мм.

	1 таб.
субстанция	1.575 г,
содержащая высушенные жизнеспособные клетки <i>Lactobacillus delbrueckii</i> spp. <i>bulgaricus</i> штамм 51 (LB-51)	не менее 1×10^7 клеток,
а так же:	
белок	от 25 до 35%,
что в пересчете	от 4 до 5.6%
на общий азот составляет	
молочная кислота	от 6.3 до 12.6%

Вспомогательные вещества: сахароза (не более 900 мг), магния стеарат.

6 шт. - блистеры (1) - пачки картонные.

6 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Препарат, оказывающий защитное действие на слизистую оболочку желудка и кишечника.

Действие препарата обеспечивается наличием *Lactobacillus bulgaris* и биологически активных продуктов их жизнедеятельности (молочная и яблочная кислота, нуклеиновые кислоты, ряд альфа-аминокислот, полипептиды и полисахариды), а также высоким содержанием белков (25-30%), которые оказывают протекторное действие на слизистую оболочку ЖКТ, стимулируя процессы регенерации в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки. Препарат оказывает также анальгезирующее и антацидное действие за счет буферных свойств белка, входящего в состав препарата.

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Гастрофарм не предоставлены.

Показания к применению:

- острый и хронический гастрит, сопровождающийся повышенной кислотностью желудочного сока;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- в качестве профилактического средства во время и после лечения препаратами, обладающими раздражающим действием на ЖКТ;
- в качестве профилактического средства после погрешностей в диете (прием пищи, вызывающей повышение кислотности желудочного сока) и чрезмерного употребления алкоголя и курения.

Относится к болезням:

- [Гастрит](#)
- [Язвенная болезнь](#)
- [Язвенная болезнь желудка](#)

Противопоказания:

При применении по показаниям и в рекомендуемых дозах не установлены.

Способ применения и дозы:

Таблетки принимают внутрь за 30 мин до еды, разжевывая с небольшим количеством воды или предварительно размельчают и смешивают с небольшим количеством кипяченой воды комнатной температуры.

При *острых и хронических гастритах и при повышенной кислотности желудочного сока* **взрослым** препарат назначают по 1-2 таб. 3 раза/сут; **детям в возрасте от 3 до 12 лет** - по 1/2 таб., в **возрасте от 12 до 18 лет** - по 1 таб. 3 раза/сут. Курс лечения - 30 дней.

При острых гастритах и недостаточной эффективности терапии суточную дозу можно увеличить в 2 раза.

Эффект наблюдается обычно к концу первой недели лечения.

При *язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки* **взрослым** назначают по 3-4 таб. 3 раза/сут в течение 30 дней.

Для *профилактики* препарат применяют в дозе 1-2 таб. 3 раза/сут в течение 15 дней, при *злоупотреблении алкоголем или курением* - по 1-2 таб. 2-3 раза/сут.

Побочное действие:

При применении препарата по показаниям в рекомендованных дозах побочное действие не выявлено.

Передозировка:

В настоящее время случаев передозировки препарата Гастрофарм не описано.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Данных о применении препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлено.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Лекарственное взаимодействие препарата Гастрофарм не установлено и препарат может применяться с другими лекарственными средствами.

Особые указания и меры предосторожности:

Препарат безвреден, не токсичен.

При назначении препарата больным сахарным диабетом следует учитывать, что в 1 таб. содержится 0.9 г сахарозы.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Препарат не влияет на способность к вождению автотранспорта.

Применение в детском возрасте

Препарат назначают детям старше 3 лет (см. Режим дозирования).

Условия хранения:

Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Gastrofarm>