Гастрогуттал



Код АТХ:

- A03ED

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Белладонны настойка
- Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка
- Мяты перечной листьев настойка
- Полыни горькой травы настойка

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[мнн мнн мнн мнн] Википедия[мнн мнн мнн мнн] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Фармакотерапевтическая группа:

- Вегетотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Комбинированный препарат растительного происхождения. Валерианы корневище с корнями обладает седативным и спазмолитическим действием. Облегчает наступление естественного сна. Седативный эффект наступает медленно, но достаточно стабилен. Оказывает желчегонное действие, увеличивает секрецию слизистой оболочки ЖКТ, замедляет сердечный ритм, расширяет коронарные сосуды. Влияние на деятельность сердца опосредовано через нейрорегуляторные механизмы и прямое влияние на автоматизм и проводящую систему сердца. Полыни горькой трава оказывает желчегонное действие, повышает аппетит, стимулирует кислотопродукцию. Белладонны лист обладает м-холиноблокирующим и спазмолитическим действием; уменьшает секрецию слюнных, желудочных, бронхиальных, слезных, потовых желез, поджелудочной железы. Снижает тонус гладкой мускулатуры органов ЖКТ, желчных протоков и желчного пузыря; вызывает тахикардию, улучшает AV проводимость. Расширяет зрачки, затрудняет отток внутриглазной жидкости, повышает внутриглазное давление, вызывает паралич аккомодации. Мяты перечной лист оказывает седативное, умеренное спазмолитическое, желчегонное, противорвотное и местнораздражающее (раздражает нервные окончания слизистых оболочек) действие.

Показания к применению:

Повышенная возбудимость, бессонница, ВСД, спазм органов ЖКТ, почечная и желчная колика, снижение аппетита, гипо- и анацидный гастрит; хронический холецистит; дискинезия желчевыводящих путей, тошнота, рвота.

Относится к болезням:

- Бессонница
- Дискинезия желчевыводящих путей
- Желчная колика
- Рвота
- Спазмы
- Тошнота
- Холера
- Холецистит

Противопоказания:

Гиперчувствительность, гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.

Способ применения и дозы:

Внутрь, по 20-30 кап 3-4 раза в день; детям - по 1 кап на каждый год жизни.

Побочное действие:

Аллергические реакции; изжога, гастралгия, диарея, сонливость, подавленность, снижение работоспособности.

Передозировка:

Симптомы: тремор, головная боль, головокружение, судороги.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие снотворных и седативных ЛС, спазмолитиков.

Особые указания и меры предосторожности:

Применение в детском возрасте

Применение возможно согласно режиму дозирования.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gastroguttal