# Гастрокап



## Код АТХ:

- A03ED

## Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

## Форма выпуска:

| ◊ ***Капли для приема внутрь*** | **100 мл** |
|---|---|
| настойка белладонны | 10 мл |
| настойка валерианы | 50 мл |
| настойка травы полыни горькой | 40 мл |

25 мл - флакон-капельницы темного стекла (1) - пачки картонные.
25 мл - флаконы темного стекла (36) - коробки картонные.
25 мл - флакон-капельницы темного стекла (36) - коробки картонные.
25 мл - флакон-капельницы темного стекла (49) - коробки картонные.
25 мл - флакон-капельницы темного стекла (64) - коробки картонные.
25 мл - флаконы темного стекла (49) - коробки картонные.
25 мл - флаконы темного стекла (64) - коробки картонные.
25 мл - флаконы темного стекла (1) - пачки картонные.

## Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

## Фармакологические свойства:

***Фармакодинамика***

Оказывает спазмолитическое, а также умеренное седативное действие.

Белладонны лист оказывает м-холиноблокирующее и спазмолитическое действие. Препятствует стимулирующему действию ацетилхолина; уменьшает секрецию слюнных, желудочных, бронхиальных, слезных, потовых желез, поджелудочной железы. Снижает тонус мышц желудочно-кишечного тракта, желчных протоков и желчного пузыря; вызывает тахикардию, улучшает атриовентрикулярную проводимость. Расширяет зрачки, затрудняет отток внутриглазной жидкости, повышает внутриглазное давление, вызывает паралич аккомодации.

Валерианы корневище с корнями обладает седативным и спазмолитическим действием. Облегчает наступление естественного сна Седативный эффект наступает медленно, но достаточно стабилен. Оказывает желчегонное действие, увеличивает секрецию слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, замедляет сердечный ритм, расширяет коронарные сосуды. Влияние на деятельность сердца опосредовано через нейрорегуляторные механизмы и прямое влияние на автоматизм и проводящую систему сердца.

Полыни горькой трава оказывает желчегонное действие, повышает аппетит, стимулирует кислотопродукцию.

## Показания к применению:

Препарат применяют в качестве спазмолитического средства при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся спазмами гладкой мускулатуры (в том числе хронический гипо- и анацидный гастрит, хронический колит, дискинезия желчевыводящих путей).

## Относится к болезням:

- Дискинезия желчевыводящих путей
- Колит
- Спазмы

## Противопоказания:

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, глаукома, гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, детский и подростковый возраст (до 18 лет), гипертрофия предстательной железы с нарушением оттока мочи.

*С осторожностью.* Алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга, заболевания печени.

## Способ применения и дозы:

Внутрь, взрослым назначают по 15-25 капель на прием, предварительно разведенных в небольшом количестве воды, при необходимости до 3-х раз в день.

## Побочное действие:

Возможны аллергические реакции. При длительном применении возможно появление сухости кожи и слизистой оболочки полости рта, расширение зрачков, изжога, гастралгия, диарея, сонливость, снижение работоспособности, парез аккомодации, подавленность.

## Передозировка:

При передозировке возможно усиление таких побочных эффектов как: сухость кожи и слизистой оболочки полости рта, расширение зрачков, изжога, гастралгия, диарея, сонливость, снижение работоспособности, тремор, головная боль, головокружение, судороги.

*Лечение:* симптоматическое.

## Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

## Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Усиливает действие снотворных и седативных средств, спазмолитиков.

## Особые указания и меры предосторожности:

Не следует принимать ежедневно препарат более 1.5-2 месяцев. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности,

требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Содержание этилового спирта в составе препарата составляет не менее 60%. В разовой дозе препарата (15-25 капель) содержится до 0.23 г абсолютного этилового спирта. В максимальной суточной дозе препарата (75 капель) содержится до 0.7 г абсолютного этилового спирта.

***При нарушениях функции печени***

Применять с осторожностью при заболеваниях печени.

***Применение в детском возрасте***

Противопоказан в возрасте до 18 лет.

## Условия хранения:

Препарат хранить в защищенном от света месте, при температуре от 12 до 15°С. Хранить в местах, недоступных для детей.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

## Срок годности:

2 года.

## Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Gastrokap