Гастроромазол



Код АТХ:

- A02AX

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр Википедия Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

Экстракт для приема внутрь (масляный) от желто-зеленого до зеленовато-коричневого цвета, с характерным запахом.

	1 мл
цветки ромашки	100 мг

Вспомогательные вещества: лецитин - 666.7 мг, α-токоферола ацетат - 95.3 мг, аскорбил пальмитат - 238 мг, масло оливковое - q.s. до 1 мл.

50 мл - флакон темного стекла (1) - пачки картонные.
90 мл - флакон темного стекла (1) - пачки картонные.
100 мл - флакон темного стекла (1) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Органотропные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Обладает гастропротекторными свойствами за счет противовоспалительного, антиоксидантного и мембраностабилизирующего действия, обусловленного угнетением интенсивности свободно-радикальных и перекисных процессов в слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Оказывает спазмолитическое действие; бактерицидное действие в отношении Helicobacter pylori, являющегося одним из этиопатогенетических факторов развития гастродуоденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Фармакокинетика

Препарат содержит комплекс биологически активных веществ, в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания к применению:

— профилактика и лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хронического гастрита и гастродуоденита (в том числе в стадии обострения), в моно- или комбинированной терапии с антацидными средствами.

Относится к болезням:

- Гастрит
- Гастродуоденит
- Язвенная болезнь
- Язвенная болезнь желудка

Противопоказания:

— возраст до 18 лет;

— повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью: хронический холецистит, состояния после холецистэктомии.

Способ применения и дозы:

Внутрь. Взрослым по 10 мл 2-3 раза в сутки за 15 минут до еды.

Курс лечения 2-3 недели. Повторный курс (при необходимости) - через 1-2 недели.

Побочное действие:

Аллергические реакции; боли в правом подреберье.

Передозировка:

Данные отсутствуют.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания из-за отсутствия клинических данных.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Данные отсутствуют.

Особые указания и меры предосторожности:

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Применение в детском возрасте

Противопоказан детям до 18 лет.

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре от 10 до 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Gastroromazol