

[Геделикс](#)



Код АТХ:

- [R05CA](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Плюща листьев экстракт](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Фармакотерапевтическая группа:

- [Органотропные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Средство растительного происхождения. Оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее, антиоксидантное действие. Сапонины проявляют антибактериальную и противогрибковую активность. Тритерпеноиды альфа-хедерин, хедеросапонины оказывают спазмолитическое, муколитическое и отхаркивающее действие. Флавоноиды (рутин, производные кемпферола) улучшают микроциркуляцию, проявляют гепато- и нефропротекторные свойства, повышают диурез, способствуют выведению солей мочевой кислоты.

Показания к применению:

Острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания органов дыхания, сопровождающиеся упорным сухим кашлем; гепатохолециститы, пиелонефриты, нефролитиаз, подагра; дерматиты, гнойные раны, ожоги.

Относится к болезням:

- [Гепатит](#)
- [Гепатоз](#)
- [Дерматит](#)
- [Инфекции](#)
- [Нефрит](#)
- [Нефролитиаз](#)
- [Ожоги](#)
- [Пиелит](#)
- [Пиелонефрит](#)
- [Подагра](#)
- [Раны](#)

Противопоказания:

Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения функций щитовидной железы, повышенная чувствительность.

Способ применения и дозы:

Применяют в виде приготовленного настоя листьев внутрь - по 15-50 мл 2-3 раза/сут; наружно или местно для полосканий, промываний, примочек. Курс лечения 2-6 недель.

Побочное действие:

При применении по показаниям в рекомендуемых дозах не выявлены.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Не рекомендуется применять при беременности и в период лактации.

Особые указания и меры предосторожности:

Растение ядовито. При передозировке возникают тошнота, рвота, диарея, головная боль, может повышаться АД. При контакте с сырьем возможен дерматит.

Не рекомендуется применять в детском возрасте.

Применение в детском возрасте

Не рекомендуется применять в детском возрасте.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Gedeliks>