# <u>Гексализ</u>



#### Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель Госреестр Википедия РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com<sup>англ</sup>

### Форма выпуска:

 $\Diamond$  **Таблетки для рассасывания** желто-оранжевого цвета, круглые, плоскоцилиндрические, с фаской, со слабым характерным запахом; возможны вкрапления оранжевого или белого цвета.

Adjust option out and a second out of the second	
	1 таб.
биклотимол	5 мг
лизоцима гидрохлорид	5 мг
эноксолон	5 мг

Вспомогательные вещества: масло лимона - 200 мкг, лимонной кислоты моногидрат - 10 мг, краситель солнечный закат желтый (E110) - 100 мкг, магния стеарат - 15 мг, акации камедь - 60 мг, сахароза - до 1200 мг.

10 шт. - блистеры (3) - пачки картонные.

#### Фармакологические свойства:

#### Фармакодинамика

Комбинированный препарат для местного применения с противомикробным, противовирусным и противовоспалительным действием.

*Биклотимол* - антисептик. Активен в отношении стафилококков, стрептококков и коринебактерий, оказывает местноанестезирующее и противовоспалительное действие. При местном применении характеризуется продолжительным действием.

Лизоцим - полипептидный муколитический фермент, оказывает противомикробное действие. Активен в отношении грамположительных бактерий, грамотрицательные микроорганизмы менее чувствительны к лизоциму. Способствует повышению активности неспецифических факторов защиты организма, оказывает противовоспалительное и муколитическое действие. Лизоцим проявляет противовирусную активность (образует комплексы с вирусами). Относится к естественным факторам защиты организма.

Эноксолон - комплексный тритерпен, выделенный из глицирризиновой кислоты. Ингибирует 11-бета-гидроксистероиддегидрогеназу, инактивирующую кортизол. Оказывает противовоспалительное, противомикробное и противовирусное действие.

#### Фармакокинетика

Исследования фармакокинетики препарата Гексализ не проводились.

# Показания к применению:

Для местного лечения инфекционно-воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта, глотки и гортани, вызванных чувствительными к биклотимолу, лизоциму и эноксолону микроорганизмами:

- острый и хронический фарингит;
- фаринголарингит;
- тонзиллит;
- состояния после тонзиллэктомии;
- глоссит.

### Относится к болезням:

- Инфекции
- Тонзиллит
- Фарингит

### Противопоказания:

- детский возраст до 6 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

# Способ применения и дозы:

Взрослым назначают по 1 таб. каждые 2 ч. Максимальная доза - 8 таб/сут.

Детям старше 6 лет назначают по 1 таб. каждые 4 ч.

Продолжительность лечения не должна превышать 10 дней.

Таблетки необходимо рассасывать до полного растворения.

### Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции, суперинфекция; при длительном применении (более 10 дней) - дисбактериоз полости рта с риском распространения бактериальной и грибковой инфекции.

#### Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Гексализ не сообщалось.

# Применение при беременности и кормлении грудью:

При беременности и в период лактации (грудного вскармливания) Гексализ назначают только по строгим показаниям.

#### Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Следует избегать одновременного применения других лекарственных препаратов для местного применения в полости рта.

# Особые указания и меры предосторожности:

#### Гексализ

Фармакологическая база данных (http://drugs.thead.ru)

При назначении препарата больным сахарным диабетом необходимо принимать во внимание, что в 1 таблетке содержится  $1.054\ \Gamma$  сахара.

Если в течение 5 дней терапевтический эффект отсутствует или выражен слабо, следует пересмотреть применяемую терапию.

#### Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 6 лет.

# Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

# Срок годности:

2 года.

# Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

**Источник:** http://drugs.thead.ru/Geksaliz