

Гексаспрей



Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Биклотимол](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◊ **Аэрозоль для местного применения** в виде однородной суспензии белого с желтоватым оттенком цвета, с характерным запахом аниса.

	1 фл. (30 г)
биклотимол	750 мг

Вспомогательные вещества: бензиловый спирт, динатрия эдетат, метилпарабен, масло анисовое, аммония глицирризинат, натрия сахарин, Avicel RC 591 (целлюлоза микрокристаллическая и натрия карбоксиметилцеллюлоза), лецитин соевый, глицерол, этанол 95%, вода очищенная.

30 г - флаконы стеклянные с пластиковым покрытием (1) с распылительным клапаном - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептик для местного применения в ЛОР-практике. *Активен в отношении* стафилококков, стрептококков и коринебактерий, оказывает местноанестезирующее и противовоспалительное действие.

При местном применении характеризуется продолжительным действием.

Фармакокинетика

Исследования фармакокинетики препарата Гексаспрей не проводились.

Показания к применению:

Местное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта, глотки и гортани, вызванных чувствительными к биклотимолу микроорганизмами, в т.ч.:

- острый и хронический фарингит;
- фаринголарингит;

- тонзиллит;
- состояние после тонзиллэктомии;
- глоссит.

Относится к болезням:

- [Инфекции](#)
- [Тонзиллит](#)
- [Фарингит](#)

Противопоказания:

- детский возраст до 6 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способ применения и дозы:

Препарат назначают ингаляционно по 2 впрыскивания 3 раза/сут независимо от приема пищи.

Во время ингаляции флакон следует держать вертикально. Перед применением флакон необходимо взболтать.

Побочное действие:

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Гексаспрей не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Возможно применение препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Следует избегать одновременного применения других лекарственных препаратов для местного применения в полости рта.

Особые указания и меры предосторожности:

Если в течение 5 дней терапевтический эффект отсутствует или выражен слабо, следует пересмотреть применяемую терапию.

Применение в детском возрасте

Противопоказание: детский возраст до 6 лет.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности:

5 лет.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Geksasprey>