

Гексэтидин



Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#) [Апрель](#)
[Госреестр](#) [Википедия](#)
[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Форма выпуска, описание и состав

♦ **Спрей для местного применения** в виде бесцветной или слегка окрашенной жидкости с характерным запахом.

	100 мл
гексэтидин	200 мг

Вспомогательные вещества: натрия сахарината дигидрат - 40 мг, лимонной кислоты моногидрат - 70 мг, натрия гидроксид (натрия гидроокись) - 19 мг, глицерол (глицерин) - 17000 мг, этанол - 4000 мг, лауромакрогол (макрогола лауриловый эфир) - 1500 мг, цинеол (эвкалиптол) - 20 мг, левоментол - 20 мг, масло листьев мяты перечной - 10 мг, вода очищенная - до 100 мл.

40 мл - баллоны алюминиевые (1) с дозирующим насосом и распылителем - пачки картонные.

40 мл - флаконы полимерные (1) с дозирующим насосом и распылителем - пачки картонные.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептическое средство. Проявляет активность в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов и грибов.

Показания к применению:

Воспалительные заболевания полости рта и гортани, грибковые заболевания полости рта и гортани, для антисептической обработки полости рта и гортани до и после хирургических операций и при травмах, как вспомогательное средство при ОРВИ, для гигиены полости рта.

Относится к болезням:

- [Грибковые заболевания](#)
- [ОРВИ](#)
- [Травмы](#)

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к гексэтидину.

Способ применения и дозы:

Диагнозы

- Боли в горле
- Гайморит
- Заболевания уха
- Ларингит

Побочное действие:

Редко: аллергический контактный дерматит, нарушения вкуса и обоняния.

Особые указания и меры предосторожности:

Особенно рекомендуется для лежачих и нуждающихся в уходе больных.

Источник: <http://drugs.thead.ru/Geksetidin>