Гексикон



Код АТХ:

- D08AC02

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- Хлоргексидина биглюконат

Полезные ссылки:

Цена в Яндексе Горздрав Столички Апрель
Госреестр[МНН] Википедия[МНН] Реестр ЕАЭС
РЛС VIDAL Mail.Ru Drugs.com[англ]

Форма выпуска:

◊ ***Раствор для наружного применения 0.05%*** бесцветный, прозрачный или слегка опалесцирующий, без запаха.

	100 мл
хлоргексидина биглюконат (20% р-р)	0.25 мл

Вспомогательные вещества: вода очищенная.

10 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с полимерной насадкой - пачки картонные.
50 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с полимерной насадкой - пачки картонные.
70 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с полимерной насадкой - пачки картонные.
100 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с полимерной насадкой - пачки картонные.
150 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с полимерной насадкой - пачки картонные.
200 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с полимерной насадкой - пачки картонные.
250 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с полимерной насадкой - пачки картонные.
500 мл - флаконы полиэтиленовые (1) с полимерной насадкой - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептический препарат, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (в том числе – Treponema pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis); простейших(Trichomonas vaginalis); вирусов (Herpes virus); дрожжеподобных грибов рода Candida, дерматофитов (возбудителей фавуса (парши) микроспории, руброфитии, трихофитии, эпидермофитии). Сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.

Не повреждает грануляции и жизнеспособные клетки кожи, не угнетает краевую эпителизацию. Не обладает местно-

раздражающим действием и аллергизирующими свойствами.

Фармакокинетика

Практически не всасывается из ЖКТ. После случайного проглатывания 300 мг C_{max} достигается через 30 мин и составляет 0.206 мкг/л. Выводится в основном через кишечник (90%), менее 1% выделяется почками.

При местном применении не обладает способностью всасываться через кожу и слизистые оболочки.

Показания к применению:

Профилактика инфекций, передаваемых половым путем:

— хламидиоз;

— уреаплазмоз;

— трихомониаз;

— гонорея;

— сифилис;

— генитальный герпес.

Дезинфекция гнойных ран, инфицированных ожоговых поверхностей.

Лечение инфекций кожи и слизистых оболочек в хирургии, акушерстве-гинекологии, урологии (уретриты, уретропростатиты), стоматологии (полоскания и орошения – гингивит, стоматит, афты, парадонтит, альвеолит).

Относится к болезням:

- Альвеолит
- Герпес
- Гингивит
- Гонорея
- Инфекции
- Сифилис
- Стоматит
- Трихомониаз
- Уреаплазма
- Уретрит

Противопоказания:

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— дерматиты.

С *осторожностью:* детский возраст.

Способ применения и дозы:

Наружно, местно.

Раствор Гексикон применяется в виде орошений, полосканий и аппликаций – 5-10 мл раствора наносят на пораженную поверхность кожи или слизистых оболочек с экспозицией 1-3 мин 2-3 раза/сут (на тампоне или путем орошения).

Для *профилактики инфекций, передаваемых половым путем*, Гексикон эффективен, если он применен не позже 2 ч после полового акта.

Содержимое флакона с помощью насадки ввести в мочеиспускательный канал мужчинам (2-3 мл), женщинам (1-2 мл) и во влагалище (5-10 мл) и задержать на 2-3 минуты.

Обработать раствором кожу внутренних поверхностей бедер, лобка, половых органов. После процедуры не следует

мочиться в течение двух часов.

Комплексное *лечение уретритов и уретропростатитов* проводят путем впрыскивания в уретру 2-3 мл раствора Гексикон 1-2 раза/сут, курс – 10 дней. Процедуры назначают через день.

При *стоматитах, гингивитах, пародонтитах* рекомендуется полоскание ротовой полости 5-10 мл препарата, 3-4 раза/сут.

Побочное действие:

Крайне редко: аллергические реакции, зуд, проходящие после отмены препарата, сухость кожи, дерматит, липкость кожи рук (в течение 3-5 минут), фотосенсибилизацию.

При лечении гингивитов – окрашивание эмали зубов, отложение зубного камня, нарушение вкуса.

Передозировка:

В связи с низкой системной абсорбцией передозировка маловероятна. Случаи передозировки препарата неизвестны.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Применение возможно во время беременности, в период лактации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Фармацевтически не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза), и мылами. Присутствие мыла может инактивировать хлоргексидин, поэтому перед использованием препарата остатки мыла необходимо тщательно смыть.

Совместим с лекарственными препаратами, содержащими катионную группу (бензалкония хлорид, цетримония бромид).

Этанол усиливает эффективность препарата.

Особые указания и меры предосторожности:

Следует избегать попадания препарата внутрь раны у пациентов с открытой черепно-мозговой травмой, повреждениями спинного мозга, перфорацией барабанной перепонки. В случае попадания раствора на слизистые оболочки глаза их следует быстро и тщательно промыть водой.

Попадание гипохлоритных отбеливающих веществ на ткани, которые ранее находились в контакте с содержащими хлоргексидин препаратами, может способствовать появлению на них коричневых пятен.

Бактерицидное действие усиливается с повышением температуры раствора.

При температуре выше 100°С препарат частично разлагается.

Не рекомендуется одновременное применение с йодосодержащими лекарственными средствами.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не влияет.

Применение в детском возрасте

С *осторожностью:* детский возраст.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°С. Не

использовать препарат после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Срок годности:

3 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Geksikon