

Гексикон Д



Код АТХ:

- [G01AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Хлоргексидин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)
[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}
[РЛС](#) [VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

◇ **Суппозитории вагинальные** белого или белого с желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы, допускается мраморность поверхности.

	1 супп.
хлоргексидина биглюконат	8 мг

Вспомогательные вещества: полиэтиленоксидная основа (полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400).

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.

5 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные.

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика

Антисептический препарат для местного применения.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий - *Treponema pallidum*, *Chlamydia* spp., *Ureaplasma* spp., *Neisseria gonorrhoeae*, *Gardnerella vaginalis*, *Bacteroides fragilis*; простейших - *Trichomonas vaginalis*; вирусов - *Herpes simplex* типов 1 и 2.

Гексикон не нарушает функциональную активность лактобацилл.

Сохраняет активность (хотя и несколько пониженную) в присутствии крови, гноя.

Фармакокинетика

Практически не всасывается из ЖКТ. После случайного проглатывания 300 мг $C_{\max}$ достигается через 30 мин и составляет 0.206 мкг/л. Выводится в основном с калом (90%), менее 1% выводится с мочой.

Показания к применению:

- профилактика венерических заболеваний (в т.ч. гонореи, сифилиса, трихомониаза, хламидиоза, уреаплазмоза, генитального герпеса);
- профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями);
- лечение хронических экзо- и эндоцервицитов, вагинитов (в т.ч. неспецифических, смешанных, трихомонадных).

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Герпес](#)
- [Гонорея](#)
- [Диатез](#)
- [Инфекции](#)
- [Трихомониаз](#)
- [Уреаплазма](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- аллергические реакции.

Способ применения и дозы:

Для профилактики венерических заболеваний назначают однократно 1 суп. Препарат следует применять не позже 2 ч после полового акта.

Для лечения назначают по 1 суп. 2 раза/сут в течение 7-10 дней. При необходимости возможно продление терапии до 20 дней.

Побочное действие:

Возможны: аллергические реакции, зуд, проходящие после отмены препарата.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Гексикон Д не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не противопоказан для применения при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Гексикон Д не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами. Присутствие мыла может инактивировать хлоргексидин, поэтому перед использованием препарата остатки мыла необходимо тщательно смыть.

Особые указания и меры предосторожности:

В детском возрасте рекомендуется применять препарат Гексикон Д.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.
Срок годности – 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Geksikon_D?page=1