

[Гексикон Д \(свечи\)](#)



Код АТХ:

- [G01AX](#)

Международное непатентованное название (Действующее вещество):

- [Хлоргексидин](#)

Полезные ссылки:

[Цена в Яндексe](#) [Горздрав](#) [Столички](#)

[Госреестр](#)^{МНН} [Википедия](#)^{МНН}

[РЛС VIDAL](#) [Mail.Ru](#) [Drugs.com](#)^{англ}

Форма выпуска:

Гексикон®

Суппозитории вагинальные, 16 мг. В контурной ячейковой упаковке 1 или 5 шт. 1 контурная ячейковая упаковка с 1 суппозиторием и двумя напальчиками, 1 или 2 контурные ячейковые упаковки по 5 суппозиториев в пачке из картона.

Раствор для наружного применения, 0,05%. Во флаконах из ПЭ с полимерной насадкой, 10, 50, 70, 100, 150, 200, 250 и 500 мл. 1 фл. в пачке.

Таблетки вагинальные, 16 мг. В контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой печатной лакированной, 5 или 10 шт. 1, 2 контурные ячейковые упаковки по 5 табл. или 1 контурная ячейковая упаковка по 10 табл. в пачке из картона.

Гексикон® Д

Суппозитории вагинальные, 8 мг. В контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ ламинированной ПЭ 5 шт. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки в пачке из картона.

Состав:

Гексикон Д (свечи)

Фармакологическая база данных (<http://drugs.thead.ru>)

Гексикон®

Суппозитории вагинальные	1 супп.
<i>активное вещество:</i>	
хлоргексидина биглюконат	16 мг
<i>основа:</i> полиэтиленоксид 1500; полиэтиленоксид 400 — достаточное количество до получения суппозитория массой 3,1 г	
Раствор для наружного применения	100 мл
<i>активное вещество:</i>	
хлоргексидина биглюконат 20%	0,25 мл
<i>вспомогательные вещества:</i> вода очищенная — до 100 мл	
Таблетки вагинальные	1 табл.
<i>активное вещество:</i>	
хлоргексидина биглюконат в виде 20% раствора	16 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> МКЦ для медицинских целей — 16,5 мг; крахмал кукурузный прежелатинизированный — 16,5 мг; повидон низкомолекулярный — 11 мг; стеариновая кислота — 5,5 мг; лактозы моногидрат — 484,5 мг	

Гексикон® Д

Суппозитории вагинальные	1 супп.
<i>активное вещество:</i>	
хлоргексидина биглюконат	8 мг
<i>вспомогательные вещества:</i> полиэтиленоксид 1500; полиэтиленоксид 400 — достаточное количество до получения суппозитория массой 1,5 г	

Фармакотерапевтическая группа:

- [Противомикробные, противопаразитарные и противоглистные средства](#)

Фармакологические свойства:

Фармакологическое действие — антибактериальное, антисептическое.

Показания к применению:

— профилактика венерических заболеваний (в т.ч. гонореи, сифилиса, трихомониаза, хламидиоза, уреаплазмоза, генитального герпеса);

— профилактика инфекционно-воспалительных осложнений в акушерстве и гинекологии (перед оперативным лечением гинекологических заболеваний, до и после диатермокоагуляции шейки матки, перед внутриматочными исследованиями);

— лечение хронических экзо- и эндоцервицитов, вагинитов (в т.ч. неспецифических, смешанных, трихомонадных).

Относится к болезням:

- [Вагинит](#)
- [Герпес](#)

- [Гонорея](#)
- [Диатез](#)
- [Инфекции](#)
- [Сифилис](#)
- [Трихомониаз](#)
- [Уреаплазма](#)

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- аллергические реакции.

Способ применения и дозы:

Для профилактики венерических заболеваний назначают однократно 1 суп. Препарат следует применять не позже 2 ч после полового акта.

Для лечения назначают по 1 суп. 2 раза/сут в течение 7-10 дней. При необходимости возможно продление терапии до 20 дней.

Побочное действие:

Возможны: аллергические реакции, зуд, проходящие после отмены препарата.

Передозировка:

В настоящее время о случаях передозировки препарата Гексикон Д не сообщалось.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Препарат не противопоказан для применения при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Гексикон Д не совместим с детергентами, содержащими анионную группу (сапонины, натрия лаурилсульфат, натрия карбоксиметилцеллюлоза) и мылами. Присутствие мыла может инактивировать хлоргексидин, поэтому перед использованием препарата остатки мыла необходимо тщательно смыть.

Особые указания и меры предосторожности:

В детском возрасте рекомендуется применять препарат Гексикон Д.

Условия хранения:

Препарат следует хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Срок годности – 2 года.

Условия отпуска в аптеке:

Без рецепта.

Источник: http://drugs.thead.ru/Geksikon_D_svechi